


1 8 **2 130** -0 -U-4 m N 02168 ဖ -U 4 **m** N 6 ဖ



带下禁事 帶下方法

〇崩漏篇

經漏不止因治一崩漏因証 崩血脉法

崩漏治法

〇婦人雜証篇

師尼寡婦 血瘕証治 筋漆因治

婦人腰痛 婦中風輕重众察 角考及張

血分弁治 **夢與** 甩交

白淫濁液 熱入血室 **医**痒因治

医療治方

戒服熟求子之誤一求嗣肥瘦弃劑一求嗣交合例法 〇 求嗣篇

〇 胎前篇

有胎諸察 諸經養育 一胎産三禁

姓婦攝養 姓婦雜病因治九例

胎痛 心腹痛

子淋 欬嗽 子懸

浮腫

腰痛

胎見哭

傷寒

胎漏

不語

惡阻証治

姓胎不長養 斷産

臨胎因治

母子呼吸同異 産後内煩治方 **虚羸証治** 惡露不盡腹痛証 乳癰論治 難産惡証 胎死因治 礙産証治 催生藥弁 〇産後篇 中風日禁角亏及張 四肢浮腫証治 乍寒乍熱附灌 盤腸產証治 見枕心腹剌痛証治一 新産三証 新産診切 產難源論 姙娠禁忌 餘一本心煩問証治 産後血暈証治 產難胎死方法 易産方法 胞衣未下論法 臨産湏知 產後藤労証治 產後乳汁弁治 **蒸嗽治方**

産後雜証治方 喘急弁治 **医**脫腫痛 **医虚發熟朝明暮發** 惡露不下呕吐 惡血腹痛 血虚煩渴不正 小便不通 口鼻黑色及蚁血証因一吃逆証治 補虚 腰痛 血虚内熱自汗頭痛 尿數遺尿 腹滿嘔吐 脇脹氣痛 子腸不収 小便不禁 積癥 **虚汗不止** 惡露不止 寒熱口眼喎斜 痢疾脚下痛

熱毒面瘡

粉刺

〇整容篇

面上黑風膏

太真紅玉膏

一桥

一孫似少女膏 一面藥

百金三

卷之七目銀畢

察證辨治啓迪集卷之七

日本洛下雖知苦齋

道三編

〇婦人門

〇婦情鬱結

歸夫婦人嗜慾多於丈夫况又思悲愛憎嫉妬憂恚

抑鬱不能自釋深固所以比之男子十倍難療由

是婦人別立方能推其所且而調之可謂盡善盡

美矣

傳大抵八男子、属陽得氣多散

故男子之氣病常八多

古女人公司

〇月經和違篇

〇月信本源

树岐伯日女子七歲腎氣盛萬更變長二七而天癸 「一下」調、之月事者平和之氣常以三旬、一見以像 一下、調、之月事者平和之氣常以三旬、一見以像 佐、主、胞胎、一野氣全盛、二脉流通經血漸盈應時 一種為血海、一 至住脉通太衝脉盛月事以時下人奏謂主奏北方之水也

惠女人,經族謂之月信蓋於調理則應時而行疾病 不生一有所非則佛抑而逆諸病生等

經族先後之說

羅 医氣/ 勝氣

(1) 婦人經水八 過期血少人 人 以 其来 下多人 医 血 熟 流散 故 其来 下多

〇經閉不行諸回並治法

選經脉不行其候有三

一則血氣盛實經絡遏閉其脉滑實法當通經缺

利地

則形体憔悴經絡涸竭其脉虚弱法當滋養血 氣也 以致經絡痹滞其脉浮濇法

當散風冷逐瘀血生新血也

国經一二陽之病發心脾不得隱曲女子不月其傳

東垣日婦人脾胃久虚或羸氣血俱表而致經水 為,風消為,息賁者死

新絕不行

或病中消胃熟善食漸瘦津液不生夫經者血脉 渴燥血海枯竭病名日血枯經絕宜為胃之燥 津液所化津液既絕為熱所燃肌肉消瘦時見 熱補益氣血經自行矣

或心胞脉洪數大便秘溢小便維清不利而經水

閉絕不行此乃血海乾枯宜問潤血脈而經自

行矣

或回勞心心火上行月事不來宜 海血經詢

行矣

經閉不行八八八十四之與

图

認作經閉血死輕用通經破血之藥 婦人經除不行多有脾胃損傷而致者不可便


者回飲食勞倦,損傷脾胃少食惡食泄瀉疼痛或 行者只宜補養脾胃脾旺則能生血而經自行 因誤服汗下攻赴樂傷其中氣以致血少而不

矣〇又有飲食積滯致損脾胃者亦宜消積補

岩脾胃無病果有血塊凝結方宜行血通經,

若夫經閉不通先因心事不足心血虧耗故之血經閉不通心血虧耗 甚則為一般沒血臟勞極之証不易治也 况月經全籍肾水施化肾水既之則經血月以乾 酒以致或能冰歷無時 o 若不早治漸閉塞不通 因食少故肺亦失養而氣滯不行則無以滋腎陰 以過肝經日母能令子虚是以脾不磨而食亦少

丹溪日八天非此火不能有生人但貴乎適中 為白濁白溫血枯發熱勞極之証不可治矣 又如崩漏不止先因心火元甚於是血脉泛溢以 行無時而泛溢也〇若不平治漸崩中不止甚則 相火挟心火之勢亦從而相有所以月水錯經妄 致肝實而不納血經日子能令母實是以肝腎之 大抵經開不行 經月一班氣盛則實了戶間心血虧耗者正氣奪也那氣者相火也 至一定為求醫雖一妙手莫能為矣 故或問日 其初皆由心事不足早不調治直 不可此而一云云



今人但見 劑,禍不旋踵矣 成一里色、紫色 者率為風冷寒之行温熱之 国

以紫黑色為熟之說

或月八 冊溪曰經云元則害義乃制熱甚者必兼,水化所 凝既行而紫黑故非寒也 倍藏府廠陽之火無日不起非熟而何0月寒則 以熟則紫甚則黑也〇况婦人性執而鄙嗜欲加 紫者黑之斯一之色 一也非冷而何

經族脉法

文口电点,

王 尺脉滑,血氣實婦人經脉 主月水不利腰腹痛 微則少血〇寸脉浮而弱八羽則無血〇肝脉沉, 不利〇少陰脉弱而微

一來O趺陽脉微而潘八濫八濫則短氣阻燥而皆胃氣濟團少陰脉微而遲八機則無神寒濫則無來此為虚經三 則失液〇凡脓微血氣俱虚年少者亡血也三月 一來〇趺陽脉伏水穀不化 胃氣衰則身体腫 甲氣表 則為治

〇調經方法

心經水過期血少也考婦多术及痰藥〇經水不及 期血熱也四物黄連の過期紫黑有塊亦血熱也

期光來、氣血俱熱柴本婦为生地香附〇過期而 附黄連〇臨,行時腰疼腹痛乃鬱滯有瘀血四物 作漏乃歷中有熱〇將來作逐者血實也桃仁香 加考婦〇過期而來血虚四物加茂橘外〇未及 必作漏四物加香附黄連〇色淡過期痰多一陳 加挑紅莪玄胡香附發熱加茶柴〇肥人飲食過 度經水不調乃是濕痰宜半术苓滑香附苦婦 四物湯治衛任虚損月水不調臍腹疼痛 當婦 右剉散水煎服加减法于後 川考 芍樂 熟地黄分等

對加四君子湯服之 往來寒熱後四物湯の經候過而作漏血氣俱歷 芍藥。經水遊少加葵花紅花。經水適來適断 頭昏加柴胡○氣充經脓故月事頓併臍下痛倍 經候過多去熟地加生地本水心經行身熟脓數

選老婦人常服 李脉沉寒而不食倍燥~我脉湍血磨倍光

傅屋中有熟月事不來四物加茶

黄泥痰故也如用薑炒 肥人驅脂溝經閉者、導痰湯如苦婦連不可服地

夫經不通或見 調經散治經水或 人参不 當婦一年麥門冬二 牡冊皮仁 右㕮咀入,生薑水煎空心温服 半夏冰心名 桂枝半系 久盛汗出就如 脾胃不和飲食少進而不生血 在情傷心名氣停結故血閉不行直調心氣通心 少多後 或 白芍藥~ 具茶 華入海七次焙乾丰名 阿膠炒珠 一月一两来 骑月不至 之削隨証用之 甘草谷七 血除熱調冒 治宜生血補 皆可服

安經湯治月經先期而來 和經湯治月經過期不行 當婦一不川考半不生地黄一不 阿膠彩珠艾葉半年條本一年 甘草五分 稱木一名 當婦一不熟地黄行 香附子不黄稻半年知母半年 右剉散水煎空心服之 紅花三分香附子仁 右對散水煎空心温服 水通八分 芍藥一木 桂半年一教茂一年 黄連八分分分 桃仁去设研 **芍藥**八分 甘草半不

獨聖九治月經不通 婦人血病宜用常婦若八肥白人與多萬同用 四物湯如荊芥條茶止血神效 經候不調以四物為主治 如經水常過期而來者 如經族過而腹痛綿々無休血虚水方倍婦地兼 如經候將來腹中陣孩作作作止血氣實也本方 馬鞭草燒存性為凡紅花常婦煎湯送下 氣虚加多或恢寒加于薑 用生地黄加桃紅牡連香附玄胡

肥人氣震挾叛阻升降本方去地加多萬甘苓 瘦人血少本方倍婦地加萬井少佐以桃紅為 生血引用也

如經候適來適断往來寒熱如應本方合小柴胡 如過期血淡者來多血少本方用生地合二陳 半橋香附,

或先服小柴後服四物,

或肥盛三一月一行者痰盛而別經脉道痰湯加

二术婦芳香附

經水過多、本方加学术

經水遊少本方加葵花紅花

〇帶下篇

〇赤白帶下氣血幹治

傳帶下是濕熱八点属氣

氣磨入,参术

二陳加著水治濕為主 血歷入,芳婦

白者治白帶人 用之早験

葵花 赤者治,赤帶

国熱入小腸為前帶 其本實熱冤結于脉不散故為赤 白帶也熱法濕除病自愈也

〇帶下五色

林 風邪出經脉流轉藏府

而發下血名為帶下

足太陰脾經其色黄如爛瓜 手太陰肺經其色白如弟 手少陰心經其色赤如紅津 足少陰腎經其色黑如脈血

傳帶下是胃中痰積流下渗入膀胱當升之無人知

乏二陳加二木外紫

甚省、上、用、二、東加二大的用瓦建子以燥濕痰

〇肥瘦辨治

傳 心

肥人帶下多是濕痰用海石南星黄稻术芳香附 樗皮冬加干萬

变人、少有此病有者是熱以黃栢滑石樗皮海石

〇帶下脉辨

国属血下,赤白脉 遅者小屋滑者生

急疾者大路實數者死

尺脉急而弦大風那人,少陰之經,女子漏白下

丁例難治之說

下之而後吐以提其氣

前人

蓋病杭有輕重淺深之異耳

〇帶下禁事 帶下、必須新厚味凡用藥寒月少加薑附臨機應 傳

變

傳東垣除濕湯治漏下惡血月事不調或暴崩不止 〇帶下方法 多下状漿之物皆因飲食不声勞倦所傷或素心 栄周身者也脾胃虚而心胞乗之故漏下月水不 調也况脾胃為血氣陰陽之根帶也當除濕去熟 氣不足心火無脾必急惰嗜即困倦氣短脾主滋

補經固真湯治白帶下流不止其心胞尺脉微 抑風清氣上伸以勝其濕又云火變則發之 著术各一 當婦酒洗獨活各半蔓前七分防風 升麻 右對作一服水煎空心温服少時以早飯壓之 蓋始血崩久則血少復亡其陽故白滑物下流 遇爱月,白带脱漏不止此湯一服立止 可一服而已止後服参善甘婦之類以補之若 秦本 名一 柴胡 羌活 黄者 灸甘盐

不止所謂日久爲白帶也乃血海枯竭津淡復

七不能滋養筋骨

右剉水煎空心熱服少時以早飯歷之 炎甘草 柴胡名 干薑 人参名

氣 是 者 於 根 東 皮 身 湯 過 血 虚 者 加 减 四 物 湯

性躁者,加黄連 人工有頭風鬼強 右爲丸服之 妙黄相滑石牡蛎一南星著水半夏

〇崩漏篇

○經漏不止之諸因并治法

国經"日生虚陽搏調之崩

東垣目婦人脾胃虚損命門脉或沉強而數疾 然皆由,脾胃有,虧下,陷於胃與相火相合濕熱下 迫經漏不止其色紫黑加夏月腐肉之臭中 有帶者, 旅义弦 級寒作於中 **, , , , ,**

大女田(长)

或 崩漏回証 微加鎮墜心火之蒸治,其心以入補、氣血之蒸,举養,脾胃 或一、故貴今服熟人事雖然其火大熾旺於血脉之中 又致脾胃飲食失節火無於其中形質肌肉容頗 似不病者此心病者 急縮兼脾胃証出見四肢困熱心煩不得服則心 必腰痛或臍下痛臨經欲行先見寒熱往來两脇 下急宜大補脾胃而升舉血魚可一服而愈 適下適断 經水不時而下 暴下不止 治法當先說惡死之言勸 喻令拒死而心不動 補強温陽經自止矣

心崩中者由臟腑傷損衝任一脉血氣俱壓一脉為 **陈柳陽崩漏自止也** 宜大補氣血之藥學養脾胃微加鎮心藥治心場 職經行依時若勞動過極臟筋俱傷衛住之氣虚 調 經財之海血氣之行外循經絡內榮臟貯若氣血 不能約制其經血故忽然而下謂之崩中崩下治

惠崩漏帶下 冊溪曰有屋有熟 虚則下溜

〇崩血脉法

国漏下赤白月下血數斗肤人 尺寸財虚者漏血以水脉浮不可治也 一題者,生死

科熱傷一個任血流散者至於昏悶其肤人数疾小為順

崩漏治法

傳治血崩不,止著耳草燒存性好酒調服立止或四 物湯調下亦效

老婦年五十三血崩久不正諸藥不効予以樣斗 蒼耳根二物,焼存性四物加,白芷于薑茅花前 湯調服其經血自此而止再不行矣

心急則治其標用白芷湯調百草霜末

墨甚者用棕毛灰後用四物加干姜調理,

緩則四物加本連参玄香附子干姜又云四物加

回多者用参考精旗上 荆芥止血妙或加髮灰

熟者用黄芩

崩過多者先用五灵脂末一服當分寒熟

蓋五灵脂八能行

紫色成塊熱四物加黄連

新血虚四物加多蓝,

崩中白帶用椒目未又用白芷末粥光服

極歌日 婦人血崩身淋瀝 椒目蓮房焼研之

藕彭亦堪乾作末 二方連服效無疑

女由

国凉血地黄湯治,婦人血崩是腎水医虚不能鎮守 包絡相火故血定而崩也

細辛 生地黄 黄連 卷活 川芳隆甘草 荊芥 柴胡 曹本 蔓荊子

黄李各一當帰半紅花少許

右哎咀水煎按計劑也經漏不止氣血下陷非

此不能治

傳益母九治婦人惡露時下不止赤白帶下亦可用 益毋草五月採除乾磨為,細末是鉄煉蜜為九章 便如酒化下或只以未每服二錢或酒或童便調

下凡婦人之仙藥也

柴胡調經湯治經水不正其色鮮紅項筋急腦痛

香骨強痛,

升麻各半 柴胡七分 港活 答式各一 灸甘草 當婦身 右細切水二盏煎一盏空心温服取微汗立止 葛根谷三獨活 曹本 紅花少許

〇婦人雜証篇

〇師足寡婦

交争作寒作熱全類温應久則為勞史記目謹少 師足寡婦獨性無陽慾心前而多不遂是以陰陽

大夫不可得何以知其肝肤弦出寸 卫是以知之 病腰痛寒熱衆醫多以為寒熱舍公日病得之欲 男子以精爲主男子精盛以思室 女子、少血爲主女人血盛以懷胎

〇血痕証治

今厥性脉弦出,丁口又上為際則性盛可知

題婦人血腹為病多與 在情内傷 調通

遂致氣凝血滯而成電

經日小腸熱已滿後熱干大腸則為伏痕結硬

瑰小腹重疼支滿胃肠腰背相引四股疼痛飲食 不進月事或前或後忧惚多要陈中生氣腫小便 淋痛面色黄黑則不得好宜用。過經和血之劑, 桃仁煎治血瘕血積經候不通

指銷令下,朴硝模族凝丸如,梧子大五更初温右為未先用,米醋二年半款,一年半下大五更初温 桃仁去波大黄朴硝各两 酒下,五六九下如赤豆汁或如雞肝太下無服 鮮紅來則止服調血氣藥補養之 萬虫 超足对

傳增味四物湯治婦人血積血痕

干凉别研尽 當婦 右網切每服五名水煎去租空心温服 川考 肉桂 白芍藥 廣茂各等 熟地黄 三綾

0筋養因治

金婦人思想無窮所願不得意治於外不能入房甚 開通旧病轉如熱証新起以致死, 能開的結散氣流濕故取效或病甚者對結不能 粗工為,白帶多用,辛熱病微者誤中有之盖辛熱 發為前麥為白溫男海澳而下女性中綿也而下

国或恩慕為筋痿

〇婦人腰痛

图野主腰婦人野歌胞若腎虚外感六氣,皆致腰痛 如神湯治男女腰痛真是如神故名之 氣滯腰痛牵牛茴香橘核必有功 風腰痛小續命湯加桃仁杜他 脾胃氣散及寒濕腰痛五積散加,松仁 延胡索 右等分爲網末酒下 當帰 东 桂心

方治腰脚疼痛

革蘚 牛膝

 柳 芍藥 當婦 川考 桂心

右各等分綱對水煎食前熱服

婦人中風輕重辨察 来者名為屋那賊害万物其体虚則風入藏府愈 故中風當家口眼開闔以別輕重 其八方之風從其鄉來者長養万物若不從其鄉 風是四時个方之氣常以冬至之日自数而起候 俞皆在背隨所中之前而乃發病婦人血氣歷損

閉手足不開延不作器者可治 開聲如鼾睡遺尿者死

角亏友張 婦

折擊急如亏宜小續命湯 婦人角考及張者体歷受風や入諸陽經腰皆及

〇血分辨治

恩婦人經滯化為水流走四肢悉皆腫滿名曰血分 証與,水腫相似醫不能審軟作,水腫治之誤也

大黄煨 人参 白茯苓 當婦 瞿麥 桂心各五萬歷新沙三 赤芍藥

各由然と

右細剉水煎温服

傳婦人 經血先新後病水 先病水後經血断 水分易 血分難

〇樓與湿交

能傷之攝理失節血氣表那氣元其正得為病其 夫人禀五行务氣而生陰陽和則藏府盛邪氣不

狀不欲見人如有對誤時獨言笑時悲泣是也脉

息運伏顏色不變可與滿合香園 茯神半两 茯苓

石萬 赤豆各半

右納到水煎温服

〇熱入血室

見鬼此為熱入血室 婦人傷寒發熱經水適來畫則明了幕則譫妄如

加味柴胡湯

柴胡 分 黄芩 人参 生干地黄

甘草各三半夏二个

右細剉水煎温服

白瑶獨液

濕熱屈滞於小腹氣血虚耗精氣累滞獨液下流

葵汁 精之狀不可為白帶治宜開結除濕去熟散氣此 謂白為如米漿然至於湛獨頻下,白水或黄水如 經一日思想無窮所願不得意溫於外白物溫積如

婦

菖蒲散治婦人月水遊陰腫痛, 的絡屈風客之風氣寒於陰與血氣相搏氣痞騰 理閉不逃越故腫也

菖蒲 右剉散入苍白水煎空心温服 當帰各一秦艽二分 吴茱萸 半两

方治性腫漏不可忍 右細剉水煎熟洗日三宜避風冷 艾葉 五两 防風 三两 大戟 二两

医痒 因治

婦人医痒者是虫與所為三虫在肠胃間因臟煙

三虫動作触性内熱則痒重者乃痛。

一方蒜煮湯洗之 方以蛇床子白攀煎水洗之

方性痒不可忍杏仁焼作灰乗熱綿暴內性中

月二易之

答由祭こ

医奢治方

一方治医中生療 杏仁焙 雄黄 攀石谷一

麝少許

金陈中生落硫黄研抹付之 右四種研網付法中

方搞新桃葉綿暴內医中日三易之

国开溪日無子之因多起於父氣之不足豈可獨婦 一代服熟末子之誤 胎子目詩言婦人和平則樂有子人私則法陽不非今 或貝養氣運動物消不作熱劑何由子臟得暖而故 求子於生血何至輕用熱劑耶 已哉然古方治婦人無子執用熱劑率皆服之夫 罪於母血之虚寒乎况母之血病奚止虚與寒而 得熱劑經血不轉紫黑漸成表少或先或後始則 飲食驟進久則口苦古乾陰陽不平氣血不和高

未嗣篇

墨無子由血少不講精俗為居今用熱藥前臟府加 氣沸騰禍不旋踵或皆服艾不知文性至熱 能成胎縱使有成子亦多病以其能損真性也

多服則必致毒人一般服則上行

傳夫人欲求嗣必先視其婦人之經脉調否如未調 必以藥調之

〇求嗣肥痩辨劑

愿肥女鰸脂满溢閉塞子宫不得孕宜行濕燥痰 南星半夏川芋防風遙活 或有术 無風流

瘦婦子官乾溢不能受胎宜滋性養血四物加香 附子黄芩

〇未嗣文合例法

婦男、錐十六而精通必三十而娶女雄十四而天癸 傳月經方絕金水幾生此時子官正開乃受精結胎 至一十一而嫁皆欲陰陽完實狀後交合則孕久 而不孕也而不育之而子脆不壽 而育之而爲子堅壯強壽〇若未并女天奏始至 巴近男色医氣早洩未完而傷未實而動是以交

之候妙合大和之時也過此佳期則子宮閉而不

受胎也 者宜深思之無公 傳日不孝有三無後為大 月候方絶 古詩曰無官一身輕有子万事足 陽精 一五百日五五五日 至陽精 六日日 入医血 合者成事過此則不孕矣 **医内陽外象離而為安 大横氣來則精開聚血 医外陽内象斑而為男 使然氣來東血開聚精** 誠哉是言也無調

() 胎前篇

○ 有胎諸察 少陰脉動甚者好手也是少陰肾主精血精交而

成孕,

傳 和而男女生故欲求嗣者先調婦人經陳經版 血氣和平陽他而陰化也蓋人之夫婦猶天地血氣和平陽他而陰化也蓋人之夫婦猶天地 經回監搏陽别謂之有子中則有陽脈也 然天地之道陰陽和而万物育夫婦之道陰陽 乎有子矣

人 久山山 多上

竭 惠 諸經養育 麗母生女必瘦補、羸母,則養血壮脾, 表父生男必弱補表父則壯脾節色 太人陽大而男娘太陽者膀太人陰洪而女至太陰者肺 又曰看上圖時夫從後呼 日妊娠四月肽 肾為胞門子戶 手少法脉動甚省、好子也 左尺偏 七月脉个 左手沉實為男 大為一女 尺中、明脉按之不絕當好子也 實大 沉細者,死人實大牢強弦緊者,生 右面首是女 左回首是男

脉經曰婦人妊娠 六月足陽明 四月千少易 養三十日治見 養之諸医陽各

者不可及刺其經必臨胎也

九月足少医八月、手陽明

傳若至期當養之經虚實不調則胎孕為之不安甚

則下血而隨矣

月肝脓養之不可對炎其經肝主筋不為力

姓三月心主脉養之不可針灸其經莫悲衰思愿 姓四月三焦脉養之不可針灸其經當静形和 姓二月膽脉養之不可針炎其經膽主精當謹驚 驚動發頭小而動經脉臍腹溝痛卒有所下 苓 参 膠 学 术 芍 門 甘 東 動有寒胎不成有熱胎即萎出風寒心溝臍急 廖妙甘 腰背強痛卒有所下 事學重腰痛胞急卒有所下 参 艾 膠 連 地 甘 芍 术 生姜 生美 東東 生姜

姓六月胃脓養之不可針炎其經此月兒口月成 姓五月,脾脉養之不可針,炎其經此月見四肢成 新花 莫静處出遊野觀走對莫範卒動驚怖寒熱往 志節飲食有寒脯滿嘔吐有熱小便難數如林 無飢飽無食乾燥有熟頭收心乱嘔吐有寒腹 府急腰痛往來有時胎上追卒有所下 膠多多 門 婦 痛尿數卒恐肢疼胎動腰痛頓小卒有所下 來腹滿躰腫卒有所下 膠甘婦 芍 苓 甘 生姜 李 東東 生姜

姓七月肺肤養之不可針灸其經此月見皮毛成 莫,定止動作屈伸,以運,血氣忽驚恐腹痛卒有 莫大言號哭莫薄衣莫洗浴莫寒飲労身搖肢 地 芩 膠 甘 康 生姜

姓八月大陽脉養之不可針灸其經此月兒九竅 成無食燥物中風寒身痛寒熱胎動不安頭眩 腑寒、目視光之 門半婦苓萬多膠甘卷白生姜

芍 婦 甘 术 蓮白 生美女

姓九月野脓養之不可針後其經此月兒除續緣 皆成無處濕冷無者。多衣卒下痢腹急胎上腰 痛不可轉則

傳夫手足十二經氣血多少不同 姓十月、膀胱脉養之納天地氣於冊田五藏備六 府通俟時而生 帰 棗 生姜

李足八沙陽一二經多氣多血

安胎之法宜各按月依經視其氣血虚實而調之 固無胎隨之患

其或感息風寒别生異証又宜按法而調治之

胎産三禁

治船産之病當從厥陰之經論之母犯胃氣及上

老一利,小便,者,内亡,津液,胃中枯燥,二焦謂之三禁不可心,津液,胃中枯燥,二焦謂之三禁不可心,,更,也, 皆屬人之縄墨也 制方之法能不犯三禁則樂衛自和而寒熱止矣

國一氣方凝始受胞胎,母須行坐端嚴性情和脫岸 **灶婦攝養**

處静室耳不聞非言目不見惡事則生男女福壽

敦厚忠孝賢明不然則男女既生則多鄙賤不壽 而愚此謂目外象而内感也

傳其妊婦早當絕法嗜慾安養胎元,

宜源而

宜温而 木宜寒 久久文行坐立

切肥甘煎烤油膩辛辣鹹酸水果魚艷狐欠

鴿雀之類即無胎漏胎痛胎動下血子腫子瘤等 証及横產逆生胎死腹中之患矣

傳日古者婦人姓子

夜則多聲誦詩道正事則生子形容端正才過了

矣古所謂胎教也

冊溪日難産之婦皆是八九箇月內不能謹飲

致氣血虎故也

全

心氣不足

狗肉子 免肉子 無聲 唇缺り

雜魚子痛解

一姓婦,雜病回治九例

國九姓婦有族投以湯藥有傷胎破血之忌必醫人

審疾势輕重量樂性高下處以中庸不必多的時

势表藥便止,

傳安胎丸 白术 條茶 神舞分等

傳胎動者因火逼,動胎逆上作喘急用條苓香附之 而不安行乃能養胎苓必取納姓沉實者用之 熱能養胎殊不知胎孕宜清熱養血使血循經 乃安胎之聖藥也俗以李為寒而不用反調温 右爲細末,附九每服五十九清米湯下蓋术本

國胎動不安由衛任經歷受胎不實(有飲酒過房 灵失宜 損動不安○或登高順風攻

張户入子宮胎動 不安〇或勞力觸冷熱,〇或飲食不適〇或居

题胎漏者姓數月而經水時下此由衛任虚不能約 青兒死母活唇白青两邊沫出子母死面青古 胞内手人太陽小陽、脉也一經為表裏人上為乳汁 赤口中沫出母死子活也 輕者轉動不安重者傷臨以冊形察之直赤者 制手太陽少医經血故也衝任為經絡之海起 生姜之類隨証用之 任虚胞内泄不能制其經血故月水時下亦名 姓婦月經所以断者雖之養船橋之為乳汁 婦考 甘 茧 蕊白 粳米

又一就食生多,遂致胎動令下血,然有血盡則整,

傳胎漏者属氣虚有熱四物加膠珠术 苓 續断 香附炒入糯米煎服 艾葉 竹茄 膠 縮炒

国内補丸治胎痛

當婦 熟地黄 各一兩

右為未審在用之或為煎劑亦可

大率妊婦唯在抑陽助陰然船前藥惡群隊若

傳姓娘二三个月忽心腹污痛不安用婦素 膠然 墨胎痛血少四物加香附為,細末紫蕪湯下大妙 姓娘四五个月忽心腹充痛大妻 十四十 陽調停不若不服為愈養 医陽調停愚詳。 **医陽交鏡別生他病** 然枳殼散差寒岩單腿之恐有胎寒腹痛之疾 甘終一 落白右剉水煎温服 右為末一撮許酒調服 塩一条炒

傳胎腫調有胎或頭面浮腫者是也属濕多梔子 傳安学散治,姓娘小便遊少遂成淋瀝謂之子淋 国白术散治,妊娠面目虚净支外重,白术 姓婦偶有所傷腹痛不安或 生姜皮 右為未米飲調服指迷方 熟其胎即安 合炒末米湯調下丸服亦可 胎元痛不可忍及下血者縮砂仁略炒為未温 酒調服不飲酒者米飲艾湯塩湯皆可覺胎中 大腹皮 陳皮 白茯苓皮 無白述 重物所壓 從高壓 有祭白皮 各半 一兩

臣多术飲治妊娠轉胞, 甘草名五 右為細末麥門冬湯調下 麥門久 通草 人参 川芳两各 當婦 灯

右㕮咀入,生薑,水煎温服 四物湯加人多白术 半夏 陳皮 甘草

按冊溪日轉胞之病胎婦 方皆用滑利樂鮮有應效目思胞不,自轉為胎 歷展在一邊胞系了矣不通耳胎若舉起居 食味厚者 庸或有之古 **南**。受弱者

吳宅龍人患之其脉似潘重按似弦左手稍和是 清而監則胞知所避而就下乃以上藥與服階 能學弦為有飲血少則胎弱氣多有飲中焦不 指探喉中吐出藥汁、作少項氣定又與之次早 子上通心則悶絕胎下乃甦甚死 亦然至八點安後治數人亦效 於其中胞系自疏水道自利 日此得之憂患潘為血少氣多則胎氣弱而不 和平見在胎則安庭亦易 北理!兒在船則逐動産亦難

紫竊飲治,姓胎不和近上浦痛謂之子懸連自不 下用乏

當婦分三 川芽 右細剉入薑蕊水煎温服 甘草 陳皮 大腹 白芍藥香光紫藕一兩 人参

保安散治胎動心問唇青口乾上衝下築手足厥 冷 當婦 人参各一 甘草二年 方治姓娘身痛或焦心欲死不能食 右細切水煎入,廖珠一两葱白一握再煎温服 白术 五两 黄芩 二兩 芍藥

右細剉水煎服乏

婦腎主腰目勞損其經虚風冷無之則腰痛甚則胎

堕、

當婦 三兩 甘草 一两

右細切水煎入,廖珠二两落白一升,再煎温服

方治姓娘腰痛如折

大黑豆三合妙熟以酒煮熟去豆空心頓服

過肺主氣外合皮毛毛竅不密則風寒来居人肺為

嫩数花散治心臟痰壅肺氣不順咳嗽頭痛

数冬 麻黄 前胡 具田姆

甘草各一石膏一两 祭白皮 紫苑各半 旋覆花 白术

右細切水煎温服

方治,妊娠咳嗽不正胎動不安

村草 杏仁谷 紫苑 兩 祭白皮一分

右細切水煎入蜜半匙温服

過孕婦不語非病間有如此者不須服藥臨産月姐 服保生丸四物湯類產下便語

黄帝問人有重身九月而精治之奈何歧伯曰無

傳治兒在腹中哭引用多年空屋下鼠穴中土一塊 題九姓城傷寒仲景無治法藥軍有忌不可與專常 題治,好婦腹中見哭 一方治姓婦傷寒憎寒發熱 婦人通治也 慈白十華 生姜 二两 用黄連濃煎丹常明之 右細切水煮連服取汗愈 治也當十月後 念姓婦 豫之即止

題妊娠伤寒百節疼痛熟些不急治即落胎 一方治,妊娠傷寒感風身熱眩暈頭痛心煩 紫蕪 柴 葛 知 桅 右細剉入薑葱水煎温服發表即安 麥門冬 陳皮 萬根 黃根 西 甘草 三分 方治妊娠傷寒安胎 右細切水煎温服 白术 右等分新瓦上炒令香加生姜水煎温服 黄芩 川芽 白术 石膏大青蕊白 白芍藥

方治妊娠傷寒

右細切入薑葱水煎温服 前 生地甘

惡阻証治

題惡阻顏色如故脉息和順肢躰沉重頭目昏眩擇 食惡聞食氣好食酸鹹甚寒熱心財嘔吐痰水

臈満惚惚輕不及<u>藥</u>重用藥

大而句是孕脓也精神如故思食臭或大吐或一方治婦人經水不行身無病而似病脓亦部滑 吐清水名曰惡阻

烏藥 人参一分 橋紅谷二 甘草一分 香附子

右細切水煎温服

傳思阻乃有孕而思心阻其飲食者是也多從痰治

一日一種人是熱

多橋散治,姓城三月内思阻吐逆不能食或心意

煩悶

橘紅 茯苓冬 麥門冬

白术

厚朴静甘草多各

在細切加生姜竹茹水煎温服

〇 墮胎,因治

鹰篮胎乃血氣虚損不餓養胎元而自鹽耳

又因怎然傷情乃火便動亦能墮胎的風撼其水猶人姓為則花遊 火能銷物造化自然病源風冷傷於子藏未得

病情者也

大战人属熟二者又當視其輕重而治之

婦有胎即隨其脓左大無力重取則牆乃血少

調本未一錢服未至三四两得保全而生 也以其妙年與補中氣使血自榮濃煎白不湯

疆夫陽施陰化故有胎祭衛和則經養周足故胎安 若血氣虚損予藏被風冷血氣不足養胎所以 數值好而腰痛者喜墮胎也

千金治妊娠三月數堕胎

灸膝下一寸左右各七出

固帶散治好胎數隨

甘兹参芳术 地 呉茱

右等分為未空心酒下忌茲桃李雀肉酸物

一法治數傷胎

鯉二九 粳米

入落豉醋 右如法作雕加塩食之甚良一月中三遍效莫

妊胎不長養

弱好後重理而生族/編婦人有宿痾而後有好/ **減府表氣力虚令**船不

長故服藥去病益氣血以扶養胎也

鯉長一尺者去"肠鱗内」塩素煮熟飲汁食胎長大

一方縮砂抹米飲調下

欲断產者不易之事雖日天地大德日生然亦有 臨産艱難或為足為相用表童蛭之類難,免受

病故平和異驗方具之 桂心各三两鼓一升

括樓

右細切水煎服之

一法附子二枝末之酒和塗古足太良

拾樓根兩四 肉桂 五两 牛膝三两

里生 一两一

胎死因治 右細切水煎温服

或因,頓小或因驚恐或出入冒觸或素病發積壞 胎最多候古青即知于死了 夫姓娘謂之重身二命係之損胎不持病真所致 一方治熟病胎死因見死冷不能自出服藥暖胎 方下姓城熟病胎死 肉桂 干薑 右爲未空心潤調下一方無附子有清黄 自出 紅花一味酒水煎飲二三盏 生地黄春一里豆炒去皮附子二分 當婦 白芍 甘草

〇姓妮禁忌 一方朴硝納末童便調下

自姓嫁初得以至臨月藥石禁忌歌 **虹班水蛭及**京虫 野葛水銀并巴豆 馬頭附子與天雄

牙硝芒硝牡丹桂 三楼代赭茫花麝 半夏南星與通草 **桃花牽牛皂角** 牛膝薏苡連蜈蚣 太戟蛇蛇黄雌雄

明佳葵干菱解印瓜 地膽多根莫用好

码砂干漆兼,桃仁

飲食謹弁

萬生子驚風而大〇食雀腦冷子患雀目勿妄 服湯藥〇勿妄針灸〇勿過飲酒類〇勿學重 飲酒今子多海無耻○食茨菰消胎氣○豆醬 合,霍菜,食脂的〇飲鱔無鮮魚難産〇食話般 食薑牙、令子多指、食水炭、食経度、食養肉 豆醬食分子而生催卵班點〇食螃蟹横生の 生心寒、〇鮮魚同田雞食令子清遊、〇雀肉同 內令子項短縮頭○鴨子與祭樓同食令子倒 令子生前触猪○食羊肝令子多危難○食驚 雞肉合糯米食今子生十白〇鮎鯉同雞子食

臨産須知 頂時時少歩動和血肤〇勿一勞力過傷使腎氣 各首時險○心有大概,了必應順○勿多時即 脾胃不和樂衛虚損子心羸瘦多病戒之戒之 不足,子必解顯不合○衣母,太温食母太飽若

懷姓十月巴滿陰陽氣足忽然臍腹陣痛胎孕偏 落之類 臨月不可洗頭以免横生逆産 陷腰間重腹\

寬道挨进黎水淋下其見遂生此 乃正産者當生自有其時如瓜熟帝懸栗熟自

其氣 氣乃不行以致難產如犯之急宜服柴蘊飲以寬 數備足方覺腹痛不可驚動太早早則舉家霍乱 婦聞之恐怖夫恐則氣怯氣怯則上焦閉下焦脹 九臨産房中不得喧鬧宜緊閉門户静以待生月 小盛間神巫覡之流称說鬼神多方哄妹媒利産 九臨産宜擇年高有觀稳婆及純謹婦人三四人 杜絕勿灸觸犯胎氣致產不利,

臨月忽然腹痛或作或止或一 日二三月胎水口

月前忽然腹痛如欲便進却又不產者名目試 來腹漏不容名曰弄痛

它穀道挺进眼中火出其時便產豈有或痛不 好事但當寬心,候時若果當產時腰腹痛極不 以上二証非當産也不問胎水來與不來俱不 痛欲產不產之候耶人多於此胡行乱做不 性命可不慎哉

初覺腹痛而腰不甚痛者未產也且扶行熟忍 岩行不得則凭物而立行得又行

産母初覺欲生便惜为調養不可妄用为見方轉 將產之時產母甚漏不清舒伸行動固執曲腰眠 世人不識但見腹痛纔作便謂生産坐婆跡在看 便用力一通念兒錯路以致横逆必待到產門 未至用力何益。 用力一通即生此所當用为也譬如多則時候 三胎元無力决至難産 **魅胎元轉動到生門已被遮開又轉又尋再** 戸以致產門狹脹乾遊難產 不俟時至便言試水試水併胞漿先破風入產

産母如覺飢進軟白粥,不会飢遇以致之力,亦不 九産母如覺心中憤悶白蜜一匙温水調服 九不可服惟生符水况血得寒即凝血一凝則胎 未產之先或煩渴欲飲水只可與清米飲 可食硬飯之類 利之設有何益哉滯而反致難産夫催生符法是野道士求食媒

九產婦胞漿未下但當稳守無妨胞漿既破一二

時後不生便當服催生藥要緊夫胞漿者本胞

内養兒之水也見既折胞其水既下胎隨水而

生藥也 子等破血之刺逐去,思血見得路而生故曰惟 閉塞道路今于無路可通故難產也如用蜀葵 下則為男生胎元無力轉頭運慢數下即血來

〇催生藥弁

一、若見水先下子道乾淡不能下者如猪脂油蜜一、若見水先下子道乾淡不能下者如猪脂油蜜一、牙蛇退之類是也 之藥如免腦筆頭灰弩

四爾犯思氣心煩躁悶難產者如縣香門難產如牛膝 苍柱五種散順元散之類 二者替停步加之义風令来虚一人子宫黑血凝滞而

產難源論

夫産育之難者皆由産婦不曾預聞講說生育道 理臨事奢惶用力失宜遂有難産之危

是故有 横生, 逆産 坐産 者則先露甘

手

足

婦産難,六由 此皆用万太早之過

富家保情產母恐運動羞出入氣閉而不舒快血 九婦人以血為主氣順則血順胎氣安生理和, 凝而不流暢的不轉動臨産必難甚悶絕質者生 育月及勞苦血氣舒暢生理甚易何俟於藥然則

母婦當貴於運動明矣

繁神恐臨産心難 一一生草太早太小揮霍或信巫或說票多誤産母心 中産必難何以知之生于頭上有白膩如膠名日一好者六七个月胎形已具恣交合敗精瘀血聚的 致也不特毋病子亦浸爛磨視成之 戴白生見身有青有黑俗名宿悲此入月交合所

四臨産初腹痛或作或止坐草太早頻試水流風乾

產道產亦難也

立立草稍久用为太<u>過產</u>毋困地抱腰之人又不稳

六盛暑居战房,月色速處開窓戶,貯清水以防血量 坐立傾側胎死腹中產難 血問血溢妄行冬末春初凝寒密閉産室内外生 火暖氣如春衣下部免胎寒血結不如此則産難

〇易産方法

婦二神散治横倒及瘦胎,

百草霜 白芷

右等分法研二錢七童便醋和粘沸湯調下

一方明乳香末一錢七既腰痛甚時新汲水一蓋入

醋調服

一方治横倒 右判煎明膠炒未入合再沸二服 滑石末一 葵子二合

法胞漿先破下多胎乾先與四物湯養血氣次濃 湯下、佳 煎落湯放冷食坐婆洗难戶食氣上下通豐仍滑 石末審調塗産戶裏次服催生藥,乳香末蜜丸温

一方蝉退一两焼 大蛇蛇一条焼 滑石五年葵子两 法治横倒諸治不效灸右脚小指光頭三壯 右細末温順流水調下

園臨産時 紅克馬歯見同為食易產 傳治横逆不順子死腹中亦用 二錢七温酒調下其兒頭戴土而出甚驗電心之 伏龍肝 細末メ

若手足先露者用細鎖則見手足心一二分深三四 刺之以塩塗其上輕气送入見得痛強轉一縮即 紅土也 順生之矣

或見脚先下、急以塩塗見脚底又可急極之併以塩 摩母腹上則正生矣

灸法治難産及胞衣不下灸至唯二穴在足小指外

身团轉肚帶攀性見屑不能下治法急令连由你 礙産証治 在足大指本節後二寸骨調問門者中炎三北 産門而不能下但云見已露頂非頂也治法令產 見身已順門戶俱正見已露頂而不能生此由見 九兒身向未順生路未正産母用力一過今兒偏 生或左腿或右腿或翳或左右額角雖見身已逼 臍帶須猴兒身正順產母用力一送兒即下生 即輕人推見向上徐人引手以中指按見肩下其 側去八甲角如韭葉宛然中三壯又多大街二六

若又頭之後骨偏柱,穀道見則露額看生人以綿 然後用力一遍見即下生人 不多今緩果手急於,製道外傍輕人推見頭令正 一通即下 母仰即看生人輕也推見近上以手正其頭用力

盤腸產証治 臨産則于腸先出甚可驚恐治法以盆盛温水温 潤其腸令産母仰則且以言語安慰其心却用米 醋半盏和新汲水七分多螺产田面或背打頓而 収每一四令一篇三四三編賜則盡以矣用参養

者也 婦苦等大劑加升柴風之類以升舉之未有不安

又法急以華麻子去殼研細點產母頗頂上即汉

〇產難胎死方法

傳治產難數日子死腹中不出母氣欲絕

右坐用水九升煎取三升分三服頓飲即下瞿麥六两 水通 肉桂各三 牛膝四两榆皮四两

一法治于死腹中而不出用黄指牛屎不拘多少 一方無偷沒有天花粉四两

塗母腹上立出

又以牛屎炒令太熱入,醋半盏聚青布於母腹上 下默之立下

故子死其候母舌青黑及胎上冷也

屬産難子死腹中者多因驚動太早機露已盡胎燥

枚生散下死胎, 桂木二錢

右温童便調下

豊城校,垂死胎死猫牛,不可,勝計,一方治死胎不出 朴硝末二錢 朴硝末二錢温童便調下

國好婦下血過多子死腹中增寒手指甲青面色黄 黑胎上擔心問乱欲死冷汗自出喘滿不食或食

毒物或誤服草藥傷胎下血不止胎者已損即下一極妙 右各等分細末蜜丸如弹子大每服一九細嚼 牡冊皮 赤芍藥 桂心 桃仁 白茯苓 淡醋湯送十連服數九立驗

〇難産悪証

身重躰熱作寒面黑古青及舌上令子母俱死。 先與其家言之 子活〇唇口俱青吐冰子母俱死〇不可不審當 面赤古青母活行死〇面青古赤口沫出者母死

國古下,肤青黑而及卷水冷者子母俱死

〇新產診切

國新產床緩滑吉實大弦急死 〇沉重小吉堅生 産後諸疾脉大的〇分明記心察之 〇寸口遊疾大小不調死〇沉細的骨不絕生〇

图冊溪曰產八歲成為既產而洪數如設豈得不死 後豊無限洪數而生者此小不來 言之今見。

〇胞衣未下論治

傳分免之後胞衣未下者不可令粗率之婦摘取當 見解破尿將致終身之害者有取下肝禁而強統

歸由産時用力見出体已渡不能更用力經停之間 萎縮而下縱及數月不害人只產母心懷安終自而後 新之 使其子血脉不潮又胞中則胞衣自刀線先繁墜,使其子血脉不潮又胞中則胞衣自 産胞受外冷血道遊故胞衣不出頂急以樂治冷 氣傷見先依法截臍帶以少物擊墜而已新時帶 者一方治胎胞衣未下 一說母生字記派血入一衣中為血脹故不下治之 右細切水煎連進二三服即下加瞿麥三多 木通三年滑石四年葵子二年 牛膝三名 婦尾二名

緩徐脹清上重心痛喘急但服奪命丹逐衣中血 血散脹消衣自下

奪命冊 温酒吞下衣爛下 右細末職醋一什熬,大黄末一两成膏和藥丸 附子 随半 牡丹皮一两 干添 食煙盡

出土思悉 或坐婆新帶收兒衣失繁住帶縮,入腹中便不得

也 一方紅花一兩酒煮濃汁服之 一方皂角棘焼末每一錢温酒調下 方取,皂屋黑塵,研為,細末酒調方寸

墨一方用童便調,朴硝末一二錢飲之立下

村一方燒鉄件,令赤投酒飲之

〇產後篇

〇母子呼吸同異

傳若夫妊娠婦子在腹中母子一氣流通全賴黎水 殊息, 能用手指胞求路而出既出胞外一冊子分躰呼吸 滋養十月數足血氣完全形神俱備忽如夢覺自

〇新産三証

国問日新産婦人有三病一者病産二者病鬱冒三

者大便難何謂也

師日新産 一一血獲活寒多故鬱冒、一一血度多汗出事中風故病產

亡, 津液, 胃燥故大便難

便脉經日産婦喜汗出者亡陰血產陽氣獨隘故當 汗出陰陽乃後大便堅者嘔不能食也小柴胡主

之

又曰産後七八日無太陽証小腹堅痛此為應露 不盡四五日不,大便跌陽旅微實再倍其人發熱 結在膀胱也 日埔煩躁譫言不食利之即愈宜業氣以熱在夏

次由老上

四十九

後之熱恐非五當可法之語 按丹溪回産後宜大補、魚血又曰不可汗下以 和以仲景治傷寒法用羡氣柴胡等藥欲退産

○ 産後血量証法

龍起坐,甚致,昏悶不省人事謂之血量其自有三婦産後血量的敗血入肝經眼見無視,黑花頭目旋量不 一有用心使力過多而量者

二有下血多而暈者

右暈錐同治異下血多而暈者且昏悶煩扎而 三有下血少而量者

心下消急口噤神管不知人用被血行血 生子了焼硬炭或江中黄石食通赤置器於床前 用補血清心〇下血少而量者思露不下上 清魂散治産後氣虚未安血隨氣上迷乱心神故 眼前生花甚悶絕不知人口禁神昏氣冷 以醋沃之得醋點除血量產後一腸時々作效 一法燒散添食烟濃萬田面 一方治産後血量危困 當婦一分赤芍藥二分 生地黄汁一盏 右水煎敷沸温服如煩熱去婦人童便妙 上緒心

秘治,産後血量心悶氣絶, 题産後雖思血方盡或(原部)斬然而止餘血停滯故 心九血量皆熟寒虚逆上溪心或以好醋 〇産後悪露不盡腹痛証治 絞痛 紅花半两 右細末童便和酒煮供冷服留 神助散治血量悶絕不知人乱語思血不盡腹肠 海再煎服 澤蘭 以支夫小便濃研墨服一升 右細末温酒熱湯調催即醒一灰有甘草 人多名一前芥 細々少飲之 塗口鼻 於傍使聞其氣

腹痛又好時犯風凉,則産時血少或産時取風凉 則血壅不通應露不盡故腹痛 一方治恐露不盡腹痛往來胸滿少氣, 一方治產後下血不盡腹内堅痛不可忍 汉蘭 敖 生姜分十十草六分 方治產後題物不盡腹内方痛 右細切水煎温服然死塗身得差 右剉煎温服未差加大黄三两 芍藥 生干地黄 肉桂 各三 桃仁 百二十个 當婦各三 東十四十 芍藥

生干地黄 右細末薑酒調下 當婦 各一兩 生薑切如蠅頭大

醫 應露不盡小腹疼痛用五靈脂香附為未醋之其

加留光桃仁〇又方五靈脂為宋神雞糊九陳皮

白术煎湯下

血刺痛用當婦乃是和血之法若目積血而刺痛

的解絲焼灰治產後腹痛酒調下 者宜桃仁紅花當婦頭魚在下焦

治産後腹中絞痛末桂温酒方寸七見二服

治産後血不盡疾悶心痛尚葉熬令香為大煎水

下方寸七

治產後餘血不盡奔上衝心煩悶腹痛以生藕汁

二外飲之

邁養血丸治産後悪血不散發熱腹痛及悪露不盡

臍腹堅脹,兼治婦女經候不調亦白帶下腹服孩

當婦 赤芍藥。兩四 牡丹皮

肉桂

右為細末煉蜜丸如梧子大每服三十九或 光湯 任下近期索 二爾

冊溪日治腹痛非芍藥不可雖新産亦可用但酒炒

答电影七

屬産母胎中宿有血塊產時其血破散與見俱下則 〇産後見枕心腹刺痛証治 方桃仁半升 孩名日見枕也 無遠若產婦藏府風冷血娛滯在小腹不通則結 一方治產後見枕腹痛 干漆碎熬 芍藥 半雨桂心 一兩 右為,細末,重便和酒調下食前。 延胡索當帰各一 芍藥 肉桂 甘草 各二 當婦 琥珀 紅花二分 蒲黄分炒

傳三聖散治見枕心腹疼痛 国失笑散治産後心腹絞痛欲死及見枕痛, 當婦 方治産後心腹內外痛 右細切水煎服之 右同煎數沸温服 生地黄汁 右細末每服二錢温酒或童便調下 右為細末醋調一錢敖成膏湯化服之 肉柱 藕汁 玄胡索多等 童便 各三

婦 ○ 産後餘血奔心煩悶証治 一方生藕汁服之効。 一方治産後餘血不盡奔衝心煩悶腹痛 方治産後七日内宿血不散時人衝心迷問 是典 荷葉三分延胡索八分地黄汁三合 右等分為和末酒服日二 竹藥川芋 生乾地黄 枳殼 芍藥 飲食不宜 竹瀝亦得 而所致也

產後內煩治方 一方治産後的虚煩熱短氣 甘竹茹一升人参 茯苓 甘草两各一

右細切水二升煮沸下,延胡空心三服是肉一日

黄芩三兩

一方治産後短氣欲絕心中煩悶 右細切水煎温服 竹葉切麥門冬 小麥各一甘草一兩

煮取,三升温服若居悸如人多少氣力,加粳米 生薑二兩大聚二十 右細對先水一斗竹葉小麥者取八升内餘藥

五合

一方治産後煩悶不安

人参 當婦 麥門冬、 桂心

地黄春春二十 粳米 一升 淡竹葉三井

芍藥四兩

右細切先煮竹葉粳米去潭入藥煎服

一說尋常諸虚煩熱用竹葉石膏湯庭後與常不

惠知 毋湯治産後寒熱通身温此心煩 同如石膏不輕用用之必死

知母以分 赤芍藥

黄芩三分桂心

六分个

甘草义

右細剉分二點水煎温服

産後作寒乍熱附種

歸陰陽不和敗血不散令作寒乍執、陽勝則作熟

不散入雕則兼醫為應治之則誤矣

陰陽不和加減四物湯俱,他証,也 記,也

別即寒熟生人陽勝則熱一一流敗血不散達止人,脾肺,耶九一陰閉一陽,如不散達止人,脾肺,耶九一陰閉一陽

知母湯治產後作寒乍熟通身温此心骨煩悶在

屬産理不順渡極筋力憂勞心慮令 虚顧容粹食不 産後藤勞証治 消邪感肺咳嗽止乾痰逆喘乏頭昏節痛腹中絞 断不用 刺祭衛受邦頻發時盜汗寒熱如應計膊煩悶肢 産前病應而産後未愈者最難用藥如常山砒石 一說治难後應疾熱多寒沙清脾湯養胃湯住也

重著床名日 夢

一方治産後蓐勞

一方治産後羸瘦煩熱自汗欲變學勞寒熱自汗 熟地黄 白术两个 當帰 右網剉入上蓋水煎温服 續断 麥門冬、 人多 川芳谷三 黄耆 白芍藥 白茯苓 五味子

羸瘦用之 肉桂 名二 牡冊皮 三个 白芍藥 當婦 地骨皮 人参西半没藥

右細切水煎温服

傳當婦羊肉湯治産後發熱自汗肢躰疼痛日久不

派名日 夢

婦身 人参名 黄耆 兩 生薑 半两

入樂慢火煮取,四盏分六服徐々服之 右細切用,料羊肉一打煮取清汁五大盏去肉

○ 産後 康 贏 証 治

婦目產傷損藏府勞侵氣血輕者將息滿月即瘥重 者日月雖滿氣血猶不調故患虚羸或飲食不節 調適失宜風邪胃氣血注藏府則肌膚不樂容顏

一方治産後星福補益祭血

當婦 港治納 延胡索

右細切水煎温服

一方治血虚勞倦盗汗多困少力咳痰

當婦 黄者 川芳 兩 柴胡 前胡 分一

右細型入,桃柳枝三寸大棗烏梅各一枝生薑

三片水煎温服若有淡不用烏梅

一方治産後屋乏不食四肢倦怠心腹陣痛補患治

氣

當婦 松姐族 生地黄

人参 芍藥

肉桂 甘草

生薑兩各一

二两

右細剉入,大棗,水前温服

〇産後四肢浮腫証治

國敗血来虚停五臟循經流入,四肢,日深不得腐如 水故令,面黄肢腫醫不知用,導水藥,九産後皆虚 又以藥虚之謂之重虚必致夫横且血行腫消則

調經散治產後浮腫

没藥 細辛 麝香 琥珀 分各二 肉桂 芍藥 當婦

右為,細末河調下

积水湯治心腹堅大如盤水飲所作 産後走埋外風四氣內傷,七情血與氣搏滞,經於 評一日産後浮腫多端有自好腫至產後不退者 治血分周効力淺難憑积水湯治氣分佳也 有满氣分滯血分之異當目,財証治之如調經散

〇產後乳汁辨治

积實二冊

白术三兩

右細切每服四錢水煎温服中軟即當散也

題皆由氣血虚弱經絡不調所致也乳汁投地勿令

食虫蟻令乳無汁若盈溢凝東壁

終地緣 施數

候也〇婦人素衝任之經有,疾乳汁少而其色黃 藥以動之〇雖有乳不多者服通經之藥以動之 生子怯弱多族也 仍以美雕引之〇屢經座乳汁多者血氣不寒之 年少初經產乳錐脹汁不行有風熱耳服清利藥 則乳行〇累經產而無乳亡凍液故也服滋溢之

産後乳汁自出身屋所致服補藥,○亦未産前乳汁 婦人乳汁不行二治 通草漏芦土 瓜根桂也 借蹄!無類強乳住也 血少氣弱遊而不行補之

散、 名曰吹妳不急治則癰腫急與指摟散以手掠之則 自出多者生子多不育書未曾論及矣 乳子忽贈乳不時泄結痛亦有不痒不痛腫腹如石

括摟散 乳香一分研 括摟根末

轉熟痛手不得近便以手提去汁更傍人吮乏不介新產兒未能飲脹結想其汁不盡皆蓄留與血氣相 右研和酒調下 重為職坊如乳

一方治吹妳作離

短

葵莖及子 右細未酒服方寸七

恩丹溪方治乳汁不通

桔梗二年 通草 七分 天花粉 瞿麥 柴胡系

赤芍藥 白芷 水通 連翹 甘草

青皮各五分

右細剉水煎食後細飲更以手摩乳房

〇乳癰論治

國足陽明之經遊不通血氣不散故結聚成癰四十 者多死〇又姓娘乳癰無害間起陽明過明者冒 歲以下治之愈五十歲以上宜速治之難差不治

渴 脉也主,肌肉不傷臟故無害也右開脉沉也 産後宜期去乳汁不宜蓄積悪汁内點則硬腫痛

以赤小豆末水調塗之尚數捏去乳汁與連翹

湯即方

連翹 升麻 芒消各十 玄参 **芍藥**

白欽 防已 射干各八大黄十二甘草六分

杏仁 八十七制表

右細剉水煎下, 告消服之

〇産後中風口噤角弓及張証治

婦血虚風入類類夾山之筋,手三陽筋結入領因産 角号也 職虚筋肤傷風寒之三陽之經偏轉之筋拘急故 口噤,躰虚受風邪我置人諸陽經則腰背及折如

方荆芥 界后表 **抬頭身及折幹白灌小續命湯,稍緩若汗出兩手** 血歷肉理不容故多行風搏之則變產口禁持強

方治庭後中風不省人事吐涎搐弱 右每服三錢豆冰酒調下童便亦可 白紫者灌之 歌甚吹身中

右細對前灌之开開緊急幹開微人灌之 荆芥 等分

産後氣血不足月末滿起早勞動虚損風冷容皮層 經絡頂弹不仁寧急也

一方治産後中風四肢孽痛背項強急。 防風一两芍藥柱心西半 **羚羊角**屑

港活 當帰 酸棗仁 牛蒡子炒各

墨產後中風口眼喎斜等証不可作風治非真中風也 右細切水煎温服

必大補氣血然後治痰

傳產後中風口眼喎斜八物加附子前芥少加防風 **羗活煎服**

)産後咳嗽治方

一方治陸後肺歷感微那咳嗽,

生地黄 各十三分 教冬花四分生麥門冬

右細剉水煎食後温服

一方治産後咳嗽痰酷稠粉氣急 前胡 祭白皮 五味子 紫苑

茯苓各八 淡竹葉 二十片

産後喘急辨治 或八黑 無人宜雜治之 若産後與塩太早而效者難治 右細對水煎食後温服

婦一方治,産後血人肺面黑喘欲死

人参二两細末 蘓木 二兩

右蕪木一味到煎去滓隨時加視入多末服之

定旗在 思露不快敗血停上薰肺喘急但服,奪命丹,血去喘

目産所下過多榮暴遇衛無主獨聚肺故喘名目派 **路**

陽絕監難治

評日産後喘可畏敗血上蓋肺奪命冊可效。

息殿終一者奪命冊未可况孤陽絕監者平 感 風寒

○ 産後口鼻黑色及衂血証因

婦陽明者經脉之海起鼻類出額交人中人在之左産 級此証胃絕肺敗也不治故無方 後氣消血散乱入諸經不能還故口鼻黑氣起變

產後吃逆証治

随産後、新血傷藏府損風冷轉氣則逆上肺虚聚

經回吃逆者胃寒藥無効灸期門期門胃之太絡也 一方治產後吃逆三日不止欲死 胃中伏寒目食冷物冷熱相衝氣殿不順則吃逆

肉桂半两 生薑汁三合

右同煎以火灸手摩背熱時塗藥汁盡

一說治産後吃逆 橘皮半夏生薑干薑之類皆效

〇<u>産後雜証治方</u>

團冊溪日産後當大補氣血為主雖有雜証以末治

路地修仁

庭後補 思用多术者福品号奏其

如發熱 輕則加苓凌之其熱自除

重則加乾薑八人肝引,我藥生血

產後發熱思寒或口眼喎斜等証皆是血氣歷其

以大補氣血為生治

補血藥多於補氣藥

在 手脉不足 補氣藥多於補血藥

産後悪寒殺熱腹痛者當去。西血若腹不滿者非一

参术湯治庭後去血過多血 是則 医虚 医虚生内部

令人心煩短氣自汗頭遍 熟地黄 當婦身 人参 白芍藥炒各 肉桂 麥門冬

右細切作,一服入,竹葉生姜水煎温服

益肌湯治產後屋汗不让

黄者二年 白术 防風 白茯苓 麥門冬谷一 甘草名半 熟地黄 牡蛎烟粉

右絕剉加大棗水煎温服

濟陰湯治產後陰虚發熟或日間明了暮發寒熟 當婦 川蒡 生地黄 柴胡分等

路迪卷上

國婦人腎製於的產則勞腎損胞諸虚未後感風乗 方治産後七八日一思露不止 腰故腰漏 方治産後風冷腰痛不可轉則 察寄生分六 當婦獨活 川寺 芍藥 當婦六分芍藥 右細剉水煎空心温服 右細切水煎温服 續對分分八 防風分八 桂心 續對 生薑

方治産後三四日悪露不下嘔吐 一方治証同前 芍藥+分 右細切水煎去滓入,蒲黄沸空心温服, 右綱剉水煎空心頓服 紅花二分荷葉中心蒂七个生地黄汁 知母八分生薑 當婦蒲黄各四

蒲黄 大黄谷八牡冊皮 肉桂谷四

牛膝

當婦谷六芍藥

右為細末生地黄汁調服血下愈

方治産後肠脹氣痛

的 汝迪表記

門冬飲治一產後血虚煩渴不止 方治產後積職人聚陽氣痛無定處 芍藥 芦根切一括摟根 青皮 厚朴 三棱 延胡索 右為細末煉蜜光酒送下 肉桂 當婦一兩芍藥 干添与分没藥 牡丹皮各半 大黄炒 木香 柴胡分二 檳榔 人参 换柳 桔梗 甘草 當婦 桃仁 枳殼分名三 茯苓各三 敞魚甲 桂心

一方治產後腹脹滿問嘔吐 甘草一不 赤芍藥 右細切水煎頓服四劑而即產忌菘菜大棗一一麥門多四两 半夏 澤蘭 人参 陳皮分

一方治産後亦白痢疾腳下氣痛, 甘草六分 當婦八分厚朴 黄連各十 右細剉入生薑水煎温服 內豆蔻五枚

右細切水煎温服四君子湯亦能治此証 次 这曲色 大十七

用怒白刺去鹿皮十餘根作一轉切作一指厚安塩 上用艾滿卷上灸之熱氣覺入腹即小便通効難具 一法産後小便不通腹脹悶乱不醒用塩填臍中却

一方治産後尿數并遺尿,

益智仁為細末米飲下

,方治産後小便不禁

雞尾毛燒末温酒調下

铁精粉上推内之, 法治庭特勞力太過医脱如脱肛狀逼迫腫痛以

方治産後子腸不収 又華麻子十四枚去殼研塗頂心如人,即去 又用五倍千白攀煎湯浸良也 八物湯加升麻防風頂以酒炒黄香為君 又用、枳殼煎湯浸良义即入 又灸臍下横文二七壯

路迪卷儿

整容篇

随 法治面上有熱毒悪產

胡粉炒 大黄柏

右為,細未,者脂調傳

法治粉剌

白礬末酒調塗之

法治面上黑風瘡

黑牽牛半竹 右為細末作面藥逐自洗之 甘松 香附于 两四

東屋角百日化為黑泥淡髮如漆涂男子白髮 用黑桑椹一 以瓶盛密封於土中

加頭髮令不洛方

有和合用雪水浸三日取水用机頭髮未不脱倒柘葉如手大框子去皮 胡桃二次去皮

博面薬 一方

益田草不拘多少院灰煮糌米和如孩子大炭 火燒通赤細研依常法用之滋潤颜色

