

乳岩辨
天刑秘錄

全

乳岩辨

辨乳岩証並治法

乳岩難治也。內湯液ヲ施す不消散者ニ潰膿外貼ヲ用レ。又証候十ヶ治功十全。
腐爛スルニ反ハ。虽神方薦レテ脱スル丁ラ能仙茶モ治ラ歟。コトナシ之ヲ召ニ求ヘハ古
賢哲ニ咎脱トノ不治ノ病トナシ。或百人必死ト云。是以四方ニ漫遊シ名家ヲ訪ヒ。憲人
シ尋是ヲ。当世ニ求ヘ。豪傑モロラ。因英雄モチラ。束テ固辞ス。比南紀ニ青列ナル者有
ア。嚴ラ千載ノ下ニ割闕ノ能此病ヲ治ト聞。及テ入テ其術ヲ見ニ。モ治効アラサレナシ。実
ニ右人曰生ノ妙術トニシ已ニ。其方ニシ得秘ソ天下ノ横矢ヲ見ニ。不忍因テ其口授
ラ記レ。鄙言ヲ如テ是ヲ曰志ニ。与テ世ニムニセント欲スレ也。

乳岩ト乳癌ト大ニ異リ。乳癌内吹外吹。上下順逆。異有ト。虽初発必突然。發後極痛。

亦腫之諸症有テ易膿易歛乳岩ノ初起結核ヲ生ト虽寒熱腫痛ノ患ナク增長
スト虽雖膿雖潰且乳癌ハ核小也ト虽不運轉乳岩ハ核大也ト虽運轉ス是其別也
乳岩ハ癌ト虽坚硬ニシテ水ヲ流ス故ニ刺破、膿不出而癌漫ス乳癌ハ癌寸ハ癌弱ニシテ
膿ヲ出テ癌刺破ハ欽了速也因ニ他瘡癌僻スレハ刺割ヲ砍乳岩ハ癌ト虽刺割ヲ欲矣
刺割スハ少々爛漫翻卷ノ諸証生可慎一液下ニ結核ヲ生者アリ此証乳ヲ治ストニ
不治ハ恐ハ再発セニラ以先生外治ヲ不施ソ湯液貼葉ヲ以スレニ其応者ヲ見ス
按ニ壯異者ハ腋下ノ結ラ乳岩ノ法ニ從テ治ヲ試ト欲動脉近キ處ナレモ内外ノ道
一可治半然ニ液下ニ反者多ハ虛衰ス且此ノ患者數人ヲ見患者方半身ノ痺癌痛或
頭痛或腰痛或偏眼之胞微癌而女子多ハ經水ノ變アリ是ラノ証ヲ詳シシホハ散
堅消塊ノ治モ有キカ余未治後覧試之冒子ニ此病有ト聞ニ未見之濃冽某ノ母

乳岩ヲ治終テ二三日ヲ経テ胸肋ヨリ頭項ニ引テ強痛又能其証ヲ診レハ肩井辺
大豆ノ大サノ結核アリ是ラノ先生刺ノ癌芽ヲ拔ケテ膿出テ前証頻ニ退又泉刃
某妻初乳岩初起梅核ノ大ノ如前方ニ從テ肩井ノ刃ヲ見レハ果シ結核アリ前
法ニ從テ之ヲ治シ散堅養柔ノ方久服セシム乳ヲ不治ソ消散ス又二婦人治ヲ施シ后諸
證全愈テ一年キシ再發シ又治ソ全愈又年許ラニ三癥スル者アリ又大再發スル者有
治ノ后三癥ス是ラノ証ヲ以考ルニ核ヲ乳房ニ結ト虽其由来スル處身体ニ根ス良
米衛虧損ノ継異哉先生曰乳岩ハ大小淺深上下左右不抱不腐潰者治ス潰爛
ゼスト虽堅硬疼痛ノ紫青色ヲ見シ或黃水ヲ出シ核不運轉者ハ不治梅ニ右ノ諸夢
見スト虽核形未シ者術ヲ施ソ可也虽然腐肉内ニ及者ハ治後合縫ヲ可施ハ治ソ可也一槩ニ木
糸トマラス改ニ是ラ不治ト云改ニ癌リ催スト虽治後合縫ヲ可施ハ治ソ可也一槩ニ木

可論治方初ノ患之者精神ヲ整ニ置乳岩ヲ患ニ依テ勞裏スルヲ云ニ亦他患或遠
路來者ハ旅中苟且ノ勞有是ヲ能不整ハ治後患ヲ生丁有早且ニ广沸散ヲ
用早且用ハ空腹ヲ欲セ也飲食近ノ服ハ必吐ヲ催ス且脳脛ノ時ヲ渴テ治ヲ施
ニ便也脳脛遲速アリ然ニ大底二時半二時ラ盛也故ニ牛眠ヲ過テ用ハ晚ニ反テ施
術甚不便也ナキヲ故ラ用ハ勢急ソ早ク脳脛スル也然ニ吐出スル丁有煎湯ヲ
用ハ脣玄遲レ吐出スル丁ナシ又人ニ因テ脳脛遲速アリ大抵一通リハ二更三時半ニ
不寃三更用ハ翌朝迄ミ不醒也脳脛スル脉少シマル也血色黒ソ粕ル也閑室ニ安
臥セシメ食ヲ寝六沸散ヲ服ノ後保護シケハ驚恐ソ脳脛輕ニ是患者術ヲ恐
テ居ル故微ク声ヲ聞テモ必驚懼ソ妄動ハ故ニ偽テ他茅ト称ソ令服スル有是故
閑靜間室ヲ欲ヘ脳脛皮ヲ渴テ食ヲハビシ脣ヲ除患者ヲ仰卧セソ弟子傍入ニ

命ノ患者ノ四肢堅ク抱持セシム脳脛ハ其ノ氣質ニヨリテ各其状ニ異ニ其一二ヲ舉
言也氣質沉齋重体ノ人ハ度ヲ渴ド虽ニ大ニ不斐少シ青色ヲ見シ准目中不了々而
妄動獨詔ス其性浮躁輕体ノ人ハ身熱甚シ面赤者ノ脉浮火シロ乾舌燥體子散火シ
妄詔不然ノ顛ソ心識ヲ乱ス也知覺ヲ失丁ハ各一ヒ輕重劇易ノ異有ト虽大抵此二条
通ス既シ窺テ食ヲ除術ヲ可施四支ヲ抱持セシムハ施術ノ間痛苦ニ不堪ソ妄動尤
ニ傷為也即ち左手ニテ核根ヲ緊ク握レ岩ラソ運動セシム皮膜ヲ伸縮ソ患トカラ
シ此既挾木小ラ癪也小力ヲ以核頭ヲ割破シ此狀刀シソ核ニカラサルヲ要トス核破
ル時ハ皮下腔トノ間ヲ握ニ不便也而乳岩年ヲ経ハ外容常ノ如ト異核内ニ腐水ア
也此核破ルハ穢水出テ核ラリ而術ヲ施ニ甚不便也瘡口ニテノ入結核ト皮
肉ドノ間筋絡ノ經处ヲ搜ツカ或利剪ニテ其縫處ノ網絡ヲ尽ク跡離シ核ヲ

出レ賛肉ノソ肉ニ不残ヨウスル也核大七ハ助骨ニ近シ故絡ヲ斯取誤テ物骨ヲ
犯ト勿又刀ノ外肉ヲ犯ト恐テ核肉中ニ残寸ハ治ト虽必再発機努ノ栗處ニノ筆墨
之能尽述ニ此是心術浮サレハ專ニカシトルト勿若施術ノ間血絡ヲ断ニ血竈走ニ止
堆ハ即家方ノ益ノ方ニ以是ヲ救シ脉絡斷者出益无走テ難^ハ和漢古今種々益
有ト異數葉燒鍼等ノ術ニ極劇ニ至テハ皆著ニ此花園先生家ノ益ノ方、
寒ニ先賢未癡ノ方ニテ甚冥事ニ功アリ然民傷处ニシテ此方用堆尋アリ故ニ貯
茅也ト且一方作テ翼トスニ効脈ナシ右三方絆繙錯綜ノ互ニ其用ヲ十ス故ニミ不
可歟此三方ヲ清テ後外科ノ要地ニ經ニ惑乱狼狽ノ患ナシ刺割ヲ施者此方ナシ六
有^カラス寒ニ外科ノ至方也道曰ノ者ニ非ハ専ニ授之丁シ禁結核ヲ去テ後焼酒
ヲ温瘡ロノ瘀血ヲ洗去金瘡油ヲ全テ瘡口合縫ス既瘡ノ下辺一針ヲ殘シノイ

ナヤニ金瘡油ヲ全挾テ洗吐ノ膜ヲ拔附ケトス鍼法其他金瘡治法從然此症核内シ
表瘡底空虚ニ肉合堆ニ故數次ニメ必薦膿此ヲ以維ヲ挾トシ誤寸ハ齧^ハ石シ歟堆
而後瘡邊椰子油ヲ塗リ結凝シ防疼痛ニ除夫ヨリ木綿^糸自ラ瀆瘡ニ貼丁三枚
又酢木綿ヲ漫前ノ木綿ノ上^ナ付^ナ三枚又其上前衝黑ヲ貯枕木綿シキ其上胸
背ニ^シ木綿シ以包裹シ閑室ニ安臥セシム衣被ヲ被フ丁前ノ如^シ麻沸散瞑眩覺
ルシ術ニシ瞑眩劇易遲速有ト異大松^ナ六^ナ經テ寃ニ又古人六沸散苦毒ヲ解ルニ塩
湯或水ヲ^ナ余屢試之^ナ寃事ニ試ニ効脈身熱煩渴シ^シ石^ナ用試ニ氏無効後字撰
之全瘡茶^ナ三黃湯^ナ用神妙也寃テ後人^ナ調榮^ナ用^ナ國家金瘡其他刺割ソ
豈^ナ者此方ニ用全家金瘡出血多^ナ雖病証十キ者ハ不出^ナ假令病証アリニ須^ナ
方^ナ不定証^ナ從^ナ治^ナ余家金瘡ノ治法^ナ國家ノ治法ト異リ而乳岩肉瘤其症

太似リ余肉瘤ヲ治ニ乳岩ノ手術習ヒ輔護ソ余々金瘡ノ濟シ以是ヲ試ルニ間
便ニ大勝レリ然ニ暫師家ノ方ヲ舉テ後学ニ示ス

饑渴並ニ便ノ用ニ内ケ患處ノ可否ヲ問宜、從テ輔護スヘシ次日患處ヲ窺余証ナク
六膿シ拔脂芋ノ諸事前日ノ如丘丁日々二三次膿ヲ拔ハシモ不期時刻患處腫痛
尤ハ膿有也若膿アラ期シ待ヘソ可拔如此スルト旨ノ鷄卵跡水綿シ去前衝黑ノシ
貯余治ハ皆前日ノ法効テ集也若他患寺ハ瘡ニ從テ宣ヲ考ヘ内外ノ治ヲ効スヘ頃
ノ其麥ヲ拳推ヘ内皮虛弱ナル者内多ハ缺ク丁有則瘡口ニ雞卵丸突ヲ貼シカスカビ
善シ以ロヲ收シ又腐爛者ニモ右ノ羔ヲ貼ス如此丘丁六七日ノ瘡口ノ付ト否ト
シ窺シ縫合ノ糸ヲ去也縫急緊急ラシ不轉移、未付ノ候也其寸ハ瘡口シマリ無緩
ニシ運轉ス此度ニ至ハ必シモ日數ヲ不期ソキ也ホラ寺ハ瘡ノ端引次第ニ去シ不蒸

八船羊補治ノ為ニ動搖ノ離了有可慎余ノ治法皆如前膿ハ瘡愈ルヲ候ニ治ラ
可止是治済大綱領也手術ノ妙处筆紙ニ准述所者口授ニシテ傳フ右乳岩ノ治
法大畧シ記ト異文詳籍亂首尾顛倒ノ其法ヲ尽スニ足ズ覽者推察之

止血術並方

夫人血脉ノ循環スラバ無所不至也故ニ其絡ヲ切ハ血走支ノ止者也此之方術亨
リ不妙然速ニ奏効者不乡我師ノ妙術ヲ奏明ス其術曰血竈ヲ能見定其
出處ヲ押ヘ置寸ハ血止ト速也凡テ一身ノ血ハ經絡ヲ循行故ニ其循リ未方ノ血竈ヲ
埋ヒ則止也寔ニ先賢未発ノ術指テ血竈ヲ押エハ此方アリカケテ押ルナリシノレハ
又アリカケル也 無明異 血竭 右二窠以鷄子白燥付瘡口甚塗藥
恭按簡便ニ云創刀刺破傷血竈出血不止用手指緊捺患處或广縷熱集半

日或一日則佳是古人已用此術為然今去寔先賢未矣術也過奉反煩黷先生
其他諸叟寔者蓋先翁與古人冥契暗合亦不可知也

飛白麵 鷄卵 右三味和調綿上貼

乳岩準附錄

調榮湯家方療乳岩後精氣未常血氣未調者金瘡損傷常用此湯

飯川芎 茯苓 午皮酒 川芎 半各少 干姜 木
右一味水煎

當飯芍藥散十全療乳岩後血氣未調遂害飲食者 飯兩半 芍參

桂 干姜 芎 甘草少 杢十枝 右一味水煎

拔爾沙摩格游霍 野牛膏 以此黑着紙燃紙之創口附諸瘡腫有膜者宜貼此黑

黃蠅半錢 松脂一錢 知也牛半錢 野牛油半錢 ホルトカル半錢 右煉法如常

家猪黑 封瘡口附治金瘡 蟬蠅多 ホルトカル油十錢 松脂 水半錢 猪油六錢

麒麟血細末 没羌八錢 乳香十錢 黃鷄油二錢 右蠟油脂入鍋以浸火絃

蠟油脂溶化尽而離火漉去滓候少冷徐下麒麟血沒羌乳香每一味燒勺

貯療乳岩後創口既欲痊時腋下有凝血為腫痛者不可忽之頻可用神効
臥安散方見不消散附錄 不消散則果為瘍瘍腫如潰膿者宜導調和之則必不可用
疎導攻之下矣又外科及破漏之病尤能走泄真氣如損神而不相適無以
於當往々至不收者多況子行拔法多出膿血者可服疎導攻下之藥矣平有

金瘡金創瘍腫及痔漏試之效更以知可否矣大膿家者慎不可服疎
導攻下之劑矣紀列伊都郎佐野村松山善藏妻三十乳房核小核大如皮色

不麥收有隱痛之狀結數處不治請予予曰是乳岩也以鴉茅漸拔取其核三寸余日而毒核不去其後瘡口數月而全愈然此治雖施常人不堪其痛若眼眩甚者與熱頭痛四肢倦怠不思飲食唯煩吊乾欲飲水謂中暑病殆為死可慎

吹乳

婦人有孕胎熱乳房內吹有因兒未能飲尽余乳蓄結以致腫痛為外吹不急治多成瘡可連服葛根加桔梗湯及桔梗散以手揉散之熱盛者寒熱交作或惡心吐

集驗連羌湯 千金外臺 療奶乳瘡 莖 杏 防 蒸 柴 丹 黃
芒硝各三兩 茄 甘 右以水九升煮取三升分服

連羌湯 癥瘡吹乳吐乳並乳瘡

茺 芥 麻 芒硝 各十枚 玄參 茄 荘 白斂 防 蒸 干 大黃
甘六分 杏 十枚 右水煎服

神妙瓜呂根散 良方 瓜呂 甘草 各九分 酒浸乳香 没藥 各一錢

右一味為末以清酒服良久再服其効妙婦人乳瘡方許多猶此方神功無比方不失一

姬乳 姬乳者盛成兒不能吃通乳脉即結乳頭生小癰熱瘡痒搔之黃汁出名姬乳如速不治之令乳孔黑熱又為焮熱腫痛必至成瘡宜赤竈皮湯二盞湯香魚膏乳頭皮乳房生瘡漫滿者以赤竈皮洗之不愈者可塗香

魚羹炒黃連胡粉散

赤童皮湯 檀木三升右一味水一升煎取荅溫洗之

二荅湯 柏凡三大黃三荆芥 防各四兩 丹若三

又方 治乳汁結成奶乳者 白斂 苓芍各三 右三味為末以漿飯服羹

匙日三若乳汁結者即可將去右乳汁乳汁結者可將去左乳汁

鹿角散 治婦人乳頭生瘡汁出疼痛不堪者 甘一 鹿角三

右末為末以鷄子黃於銅器中置溫延瘡上傳之日次

一醉膏 治乳癰乳腫 瓜蒂十 甘草一 蒜葉

右三味以紅酒三椀煎至椀半分兩次溫服

前臍毒橘皮湯 奇方乳癰未成膿者用之

葛根 橘皮各一 石羔二 甘沒藥 飯 銀杏 皂刺各半 青橘皮取汁元

燒乳橘皮湯 乳癰並膿潰者主之

瓜呂 青皮 甘草 飯 茗 芳 參芍 陳 右九味水煎

又奇方 治乳腫痛不可忍者 升 广 甘草 白芷 銀杏 青皮

飯 茗 貝母 薑根 橘皮葉

右十味水煎入酒半椀內服不拘時 一方以蠟蠅油煉丹之

杳魚薰 黃連兩 胡粉一 辰砂一

右三味以杳魚腸油和合傅之一方以蠟蠅油煉合傅之

乳頭裂 秋茄子裂閑者陰燒存性水調塗之又蠅牛霜和麻油傅之

乳癬 乳頭及房生癬瘡溫痒者以二荅湯洗之不治則生黃矣

大黃 热治寒溫頑癬不論新久但皮膚頑硬串走不定唯痒者

硫黃

八錢

明谷粟

川椒

右三味為末大黃根搗汁和前藥調為膏

碗貯新鮮孤損擦之本方加硝石樟腦

乳結核 氣滯滯乳房內結核如果核子與乳石初起相似能察其機微而莫誤矣
乳石核硬而漸腫大也乳歷核軟而荏苒不腫大也小此則加石姜湯主之兼用
瓜薑散

清肝鮮蔚湯 桑葉 治氣滯乳結腫硬不疼痛久漸作痛或胸膈不利支體倦急
面色痿黃飲食減少

乳腫 凡冷入乳房邪熱結為寒熱腫者與葛根加桔梗湯小柴胡加石姜二醉膏
乳癌 核久肉脹為痛堅硬厥熱手不可近謂之乳癌

瓜薑橘皮湯 治乳癌腫痛 葛根 橘皮

各一錢

石姜 皂角 金銀

甘 茶葉 飲茶 右八味水煎

治乳癌

一方

麥門 番 芍 茜草

各二兩

桑寄生

兩

太極上攻

人參

苡 防 甘

右九味水煎

治乳癌腫痛傳方 將

鹿屎

新者

黃連

右三味搗為末以黍米粥和調傳

乳四邊痛止即愈若無黍米則粟粃未佳也

乳瘻 乳癌惡肉久不癄者膿不尽者欲成乳瘻

桃膠散

芙蓉 銀精 桂辛 杧 芍

參 防 千姜 飴

右一味合十節須服方寸七日三服夜一服至十日膿出多勿怪煎方

水三合煎取吞

乳瘻久不癄者治方有二事外以羔羊着紙燃綻之瘡口去皮肉或輕刀割瘻

孔去瘀物數破適內投之易根木附湯兼以七宝丸六厘寒証大黃桔丹湯
加薏苡　圭木附　倦人或左突潤肌之類

乳岩辨終

天刑祕錄

青洲先生著

夫大麻風之証上古云癘風或大風癩瘡皆是一也為其証或眼赤黑白又癥瘕頑癱
身體手足不仁麻木或癰赤白黑又癩瘡手足曲節者毛脫落面部生瘡破爛鼻
梁崩壞凡此証有皮死肉死血死筋死骨是也皮死者大木不仁肌層痺肉死
者腐爛切之不治痛也血死者破壞膿汁流出筋死者手足屈曲或脫落目損骨死
者鼻梁崩面色黑瘡瘍或浮腫足心穿孔或骨質眉毛脫落是則立敗也中
筋死之証確一

廉頭丸　麻頭霜四錢　紅芷苗霜三錢　龍腦一錢　特軍一錢　大枳子七錢
右味先研杵大丸六七下為末入余茅和調丸每日三錢白湯送下

下步方 雄黃三錢 大戟各三錢 苦辛 皂刺各三錢 桑皮霜

輕粉 右七味為末糊丸每服五錢或半錢

神仙百中散 序倉家方治紫赤黑白癩瘡百癰百癧中屢經驗如神方

參 白蛇 烏蛇 血竭 真珠各六錢

右五味為末日用夏加金粉白湯送下更含凡子丸其方凡子十隻一果
糊丸如穗子大日三十九粒用白凡子利腸胃

皂子 巴豆四錢 入乳鉢內搗如泥右為末糊丸作四枚濕紙包裹煨以後
臭度為用法強者用四錢弱者用三錢先欲用之則禁鹽湯物三日而早晨
頓服當大便下利若利則宜以水增汁及薑薑食即止

震靈丸 龜井家傳二号治癩疾

楓子 去皮二十枚 天石 三錢 大黃 黃柏各三錢 麵瓜炮存性 炉甘石 三錢

荊芥 一錢半 山櫻皮 一錢半 右八味納末為丸分作日一粒重 一錢四分
日三服三粒白湯送下丸服此丸至十日臨收宜服金声散

金声散 大黃 一錢 川芎 一錢 蒜苗 一錢

右三味為末臨服姜半溫酒送下次日早宜下王振丸

王振丸 白豆 木香 川芎各四錢 巴豆 二分半 干姜 三分半 右五味為末

薄粥糊丸梧桐子大十日臨服以姜白湯送下丸此日不可用震靈丸

通天再散造 大黃 皂刺 一錢半 蒜金 黑豆

右五味為散每服一錢溫酒送下

白花散 白蛇 烏蛇 一錢半 雄黃 三錢 大黃 一錢 右四味

又方 醫列圖
元札傳

大鳳 一錢 蒲黃 六錢 廉頭霜 三錢半

片脣 一錢半 烏蛇

右六味為末熱湯服一劑四日

白蛇 各一錢 右六味為末熱湯服一劑四日

白蛇 各一錢 右六味為末熱湯服一劑四日

又方 金粉 二錢 銀粉 半錢 麻頭霜 半錢 白蛇 一錢 乌蛇 一錢 虎且 半錢

腦梓 一錢

右七味凡子半錢搗為泥丸之

又方 金箔舞 乌蛇 白蛇 一錢 大黃 紅芩 三錢 大帆子 生度百六十克

右味為末如彈子大以生酒送下一劑凡十二日服三劑奏効

生眉毛脱落方 雷丸穀黑炒 黃丹黑燒

右二味

天水丸

ソソニル 二錢 石蜜 一錢

蕎麥 右三味為末

又方 甘草 三錢 大黃 一錢 雷丸 四錢 苦辛 大帆子 百六 生乳 一錢

右糊丸每服八錢或一錢

治癩疾方 大帆子

皮共二錢

麒麟血

滑石 午膝

合共一錢一本作十錢

真珠 一錢

麻耳霜 十錢

黃牛糞 十錢

右八味先能搗大凡八種散藥研合如煉藥

丸服著不蔓也黃牛糞三取方近村或村民ノ便フキヲ能見分テ四日未可

父葉ヲ許テ喰セ七月八日ノ朝父斗ノ糞ヲ取霜ヲ置ノ虚寒ヲ見計シテ可

又方 大凡子

去皮去心 午膝 滑石各 一錢半

麒麟血 一錢

廉草 一錢半 真珠

右六味為末煉藥凡子半錢半前分量少許有異同

又方 大帆子

一斤去壳炒

星進 三錢 石蜜

木香各 一錢

露蜂房 一錢 麻茸 二錢 熟

右六味杵大凡子諸藥又再為末以白飲味增汁服丸一劑之末以二七日服尽

至六劑病過半愈者為春秋二分半一劑全服之

若服之氣上逆劇者此方飯芻芍荆大黃防風

石水煎一日服一貼反貼

青洲先生常用方 二箔凡子丸又補天丸 金箔半枚目窠 銀箔六竅
鹿頭九味 白蛇八味 將軍 “烏蛇” 真珠四味 片腦五味 大凡子壹百
克 各用三劑而後見功服茹子不三錢若服前方後上衝刷者再進防
通湯

天刑祕錄大尾

30
5805

