

頭痛 附鬚髮

半夏白朮天麻湯 治眩暈眼黑
黑頭旋惡心煩悶氣短促上喘無力以言心神顛倒目不敢開如在風雲中痰厥頭痛身重如山四肢厥冷不得安卧此乃胃氣虛損停痰而致也

陳守 半夏各七分 白朮各五錢 蜜炙 天麻半分 甘草參分 伽曲各三分半 澤瀉各三分半 精炒二分 定泊一分半

右煎食前服

按治頭痛眩暈四肢厥冷之方也○腎虛而上熱下冷常

頭痛惡心嘔吐心下痞滿與此湯而安

二

驅風觸痛湯　治諸般頭痛

門冬一分半　羌活　搖芸各一分　精斤　芷各一分半　蔓荊八分　木香五分　細辛各三分

右入姜煎服○一方去木加菊

○左痛加柴胡各一分半　紅游各七分

○右痛加芎一分半　葛二分　○正額上痛加白芷一分半　○當頭痛加升麻五分　守宮梢各一分　○風入腦髓而痛加蠍一分　○氣血兩虛有自汗加芪一分半　參伽地各一分

按治頭痛之總司也

三

當歸補血湯　治血虛與風

頭痛

斤芎　芍　地　參　莎

各一錢　藁本　柴胡各五分　假本

右水煎服

按頭痛偏左者屬風與血虛也宜此湯予用此湯加地榆阿膠黃連治下血雖爲偶中

四

加味四物湯　治血虛陰火冲上頭痛

斤芎　地　參　連　柵各等分　椒　薷

右煎服

五

## 黃芪益氣湯

治氣虛頭痛

芪一兩參 伽 貴 守 斤

芎 本 芔各五分 周 桐

小芔各三分

右入姜棗煎服

按頭痛偏右者屬痰與氣虛也宜此湯

六

## 調中益氣湯

治氣血兩虛頭痛

芪 參 芔

周 柴 貴

小芔各二分

右水煎服

按頭痛左右俱疼者氣血兩虛也宜此湯

七

## 川芎茶調散

治諸風上攻頭目腎沈偏正頭痛鼻塞聲重傷風壯熱肢体酸痛肌肉瞤動腠熱痰盛婦人血風攻疰大腸穴痛但是外感風寒并効

芎 假各二兩 蘭 涉各四兩 羌

芷 芔各一兩 芸七分半

右爲末食後茶清湯調下姜葱煎服亦可也○本方加女一小五蚵蝉各二分半名菊花茶調散

按此方治風気頭痛之劑

八

## 回首散

治頸項強直筋痛或挫頸轉項不得者耶

烏藥順氣散 見于中風 加羌活 防風 川芎 白芷 細辛 薄荷 生薑 蔥白 名曰神芎導水

九 補虛湯 治七情聲延隨氣上留陽經心中怔忡四肢緩弱翕然面熱頭目眩昏如欲搖動一切風虛眩暈

參 蔞 顏各一分 甘草 芪各七分 奴

右入姜五片 秫米一撮 水煎服

十 安神湯 治頭痛頭旋眼黑

芪二錢半 羌一分 薰 升 蜘雷各一分 芸二分半 生甘 炙甘各二分

右水煎入芎藭各三分 再煎食後用

按証治類方云東垣用溪治



虛熱頭痛大率皆以酒芩酒連酒柏加風劑也

十一 補中益氣湯 治飲食勞役及惱怒眉脫者方見內傷

本方加愛玄佐以六味丸

心痛 即胃脘痛 附腹痛

十二 清熱解鬱湯 治心痛即胃脘痛多因氣鬱日久蘊積成熱而作痛也

丹 二分半 芎 枳各一分 精 連各七分 陳 永炒各五分 甘三分

右入姜煎服服後戒飲食太半日或加沙一分亦可

按此心痛之捷法也

椒梅湯　治心或腹痛時止時
酣自磨紅者是胃中有蟲作痛
椒梅　椒　揀　實　蓉　莎
砂　鈴　朴　永　耳
右入姜煎服
按治因蟲而心腹痛之方也

姜桂湯　治初起胃脘寒痛
永　良　桂各七錢　蒼
朴　貴　蜜　耳　茴　奴
砂　莎
右入姜水煎服○痛甚加乳○
手足厥冷脉沉伏加走良○
泄瀉去奴
按綿綿痛無增減脉沉遲者
寒痛也宜此湯

枳縮二陳湯　治延在心臍上
攻走腰背嘔噦大痛方見于
按此方治心臍大痛厥冷嘔
此者

芎朮姜桂二陳湯　治素有痰
火胃脘急痛不可忍者
芎　永　蒼　枳　守　令
各一貴一戔二分　耳五分
右入姜水煎服

一方　心脘肚腹痛小腸積塊
冷氣証屬虛寒者宜服
朴　芎　貴　令　砂　桂
延胡索各一錢　洗各二錢半　炮一錢半

喬五分 三分

右水煎服

四味烏沉湯

麥 滹 砂 治心脾刺痛

右入姜水煎服 沉各等分



開鬱導氣湯

總治也

蒼 滹 芎 芷 令 治三十切腹痛之

丹 皮各二錢 貴 永各五分 甘草少許

右水煎服



散火湯 治熟痛

察 砂 茴各五分 連 芎

丹 奴 貴 朴 滹 芎

右入姜水煎○痛甚不止加延乳

按此方治乍痛乍止脉數者



香砂平胃散 治食積痛痛甚

大便實熟去本香 蒯 莫 姜 加大黃下之

滹 砂 蒼 朴 貴 奴

益 曲各一錢 蜜 桂 永

右入姜水煎服

按腹痛而渴渴後痛減者食積也宜此湯



溫中湯 治虛痛以手按之腹痛上者是虛痛

良 薑 益 砂 蜜 滹

朴 貴 茴 斤 延 耳

各等分

右入姜水煎服

**活血湯** 治死血痛并治血結痛

斤赤芍藥 奴各一戔 甘草七分 桂枝二分 蜜五分 各

右入姜水煎服



**七仙湯** 治腰痛

蓼茂童便各等分 延胡 桂蠶荷

右水煎服

**資大黃湯** 治食積痛併積



熱痛大便不通者方見飲食

**大七氣湯** 見積聚

**腸痛** 附腰痛臀痛

**疎腑飲** 治左脇下痛肝積屬血或怒氣所傷或跌撲閃挫所致或爲痛

連吳炒二錢 柴胡各一錢半 童便各半盞

**芎芍各七分**



**通氣防風湯** 治肩背痛不可俯仰

右煎食遠服

按治腸痛之主方也若右脇下痛者肝邪入脾故加姜黃桂陳茸生姜



防風 羌活 獨活 川芎 蒼朮 白芷 甘草 各一錢 當歸 生地 各一錢半 桃仁 紅花 各七分 姜黃 桂枝 各五分

瞤顫者此手太陽經氣鬱而不
行以風藥散之青痛屬腰似
折項強掇此足太陽經不通行
羌活 各一分 本 芎 各一分
芷各五分 蔓荊三分
右煎服〇如身重腰沈沈然經
中有寒濕加蒼朮各五分輕者附五分重
者川烏五分
按治四氣鬱而脊痛之
方也補愚按面白脫色氣短
者勿服



推氣散 治肝邪入肺右脇
痛甚脹滿不食
檳 奴各二枚 少許 艾 灸五
一方加貴一半 一名田艾



右入姜水煎服

治肝火盛木氣
實脇下痛左右俱痛者肝火
乘而木氣實也
柴胡芍歸湯
柴胡 芍藥 各一錢 當歸 川芎 各七分
梔子 甘草 各五分 龍膽草 各三分
右入姜水煎服

治腸痛及小腸
至遠臍併痛氣內外疼者
平肝流氣飲
青皮 陳皮 各一錢 連翹 各八分
枳殼 各七分 芍藥 各四分
香附 各六分 川芎 各四分
甘草 各四分 童便 各一杯
右入姜水煎服



治發熱胸脇嗽
柴梗半夏湯
柴胡 半夏 各一錢 桔梗 各八分
黃芩 各七分 人參 各六分
甘草 各四分 生薑 三片
右入姜水煎服

滿兩腸刺痛者
柴二錢半　芎　芍藥各一錢　杏仁各八分半
右水煎服○口燥渴去芎○痰在腸下加半夏薑汁

補陰湯　治腎虛腰痛
斤杞　紫石英　仲令各一錢半　五味子　杜仲各七分半
右入棗水煎服○痛甚者加乳
砂泉去杞貫

養血湯　治腰痛腿痛筋痛痙攣
斤杞　杜仲　桂各二錢半　五令一錢半　芎五分半
令芸各一錢半

調米活絡湯　治濕熱爲痛肩背沉重肢節腰膝疼痛胸膈不利
參　周　苦　蒼朮各二兩　白芷　雷丸各一兩半　滑石　猪苓各八錢半　羌活　防己各五錢半
右水煎入酒少許服

當飯拈痛湯　治失力腰閃或跌撲瘀血凝滯及大便不通而腰痛者
升麻　葛根各二兩　蒼朮　白芷各一兩　羌活　防風各一錢半
右煎服

腫痛不可忍者宜此湯

二陳湯　治濕痰腰痛腰背重濕痰痛者是痰也

本方加蜜苗乳延砂蒼羌參

方見于痰門

舒筋湯　治血滯腰痛亦治跌撲損

延　升　枝各等分





加味四物湯　治跌撲血腰痛

本方如嬰

二术湯　治痰飲雙臂痛者又治手一臂痛是上焦濕痰橫行經絡中作痛也

蒼二錢半　柏　星　貴　令　莎



治　羌　蔵　耳各一錢　守二錢

右入姜煎服

滋榮調中湯　治臂痛及腰酸或有時作痛

令　伽　介各一錢　貴八分　守

芍　泠　酒　倍　瓜各七分

羌　獨各六分　芎五分　芸五分　枝三分

右入姜煎服



參合湯　治背心一點痛

貴　守　令　婆　奴　蚕

芎　芷　軍　利　永　水

莎　蒼　羌各等分　耳減半

右水煎服





豁痰湯　治眉背疼痛

守冊各一錢　海桐皮 奴各八分
赤芍藥　蒼朮　利　莎　各七分
芎　藭各五分　甘草二分
右入姜水煎服○痛甚加羌活二錢

五積散　見中寒
敗毒散　見傷寒
烏藥順氣散　見中風
木香順氣散　見諸氣
三和散　見干氣門
獨活寄生湯　見中濕
滲濕湯　見中濕
按右之數方隨証可用之
治風濕臂痛諸藥不効者



羌活導滯湯　脚氣初起一身盡痛或肢節腫痛二便阻滯先用此導引後服當飯指痛湯

羌活　揺　升麻　各二錢　離一錢半　洞
右水煎服

當飯指痛湯　見脇痛

左經湯　風寒暑濕流注腰脚痛二便秘澁喘滿煩悶治

守蒼朮　葛根　愛朴
令離洞　枝芎

芸 柴 芩 蚕 各等分

右水煎服○本方去芎蘇愛林洞柴芩蚕加伽細以枝爲桂名

## 麻黄左經湯

○又加細伽永去卑葉朴離洞羌蚕 各半夏左經

## 防己飲

二方俱治法同○喘急加杏雪

湿熱脚氣常腫者宜

此湯

桂 蒼 伽 離 各七勉分

洗 芎 各五厘 甘 節 翁

右水煎服○熱加芩○熱甚及加石膏○有痰加瀝半姜○天令暄熱加黍○或屈○大便秘加芒硝○小便秘加猪苓澤加倍○常腫者專主乎湿熱肥人加疾藥

## 損蹶散

治風湿脚氣脉遍氣道方見傷寒

## 烏藥平氣散

治脚氣上攻頭目胖脉膝疼痛諸氣不和喘滿急促

麥 神 甘 參 伽 芎 各等分 軟

右入姜棗水煎服

## 治湿熱脚氣方

水 桂 余 瓜 芋 分 離 洗 蒼 奴 甘 炙 涉 羌 活

右水煎服○痛加木香腫甚加

腹〇炙熟加虎玄

五九 三和散 気門
六一 五積散 中寒

右四方隨證宜用之

六三 羌活湯 治遍身骨節痛者是皆血氣風濕痰火也

羌活 芎 各一斤 芍藥 防風 細辛 各半斤 蜜丸 陳皮 各七分 甘草 三分

右入姜煎服〇風痛加芸〇濕痛加蒼〇熱痰痛加芩蔞實瀝〇血虛痛加芎歸〇上痛加芷蘇〇下痛加梢膝〇痛甚加乳〇灸熱加柴〇小水短澁加通

六四 加味八仙湯 治手足麻木痺証痠痛

沂汗 苓 各一分 滑石 各一分 陳皮 各八分 芍藥 各七分 守胡 各六分 參 尤佳 芎 各五分 柴胡 各四分 枝 三分

右入姜棗煎服

按治痛風之方也

按治麻木之主方也〇因濕痰而手足麻痛者氣虛也宜用此湯若軟痺者血虛〇一男上体麻痺舌痺不知酒味此方得妙術〇予母七十餘歲咳嗽後舌痺不知飲食味此湯三

貼而愈

## 疎經活血湯

治遍身走痛如刺左足痛尤甚左屬血多因酒色損傷筋脉空虛被風寒濕熱感於內熱但於寒則痛傷筋絡是以晝輕夜重宜以疎經活血行濕此非白虎歷節風也

羌活 防風 蒼朮 陳皮 川芎 當歸 各一錢 白芍藥 桃仁 各一錢半 甘草 紅花 各六分 生地黃 酒芩 各一錢 牛膝 威靈仙 各一錢半 桂枝 各三分 加減法 痰加星半夏各一錢 上身及臂痛加桂三分 下身並足痛加瓜通梢屋各一錢 氣虛加參朮各一錢 血虛倍四物



節走注疼痛牽引脇背亦作寒熱喘咳煩悶或作腫塊痛無轉側或四肢麻痺不仁或背心一

湯加紅花

按治痛風風屬血虛者故遍身走痛日輕夜重○懷娠婦人潮熱咳嗽吐痰盜汗足痛痰注痛脉細數滋陰降火湯不效故此湯去膝嬰得奇效○傷酒食邪乘經絡虛爲痛風與此湯而安○中風之人偏身或手足痛用上下加味而得

黙如水冷脉滑乃是濕痰流注
經絡閉節不利故也

星田　陳　苓　蒼朮　各三錢五分　甘草　芍藥〇千臂痛加桂〇脚痛加膝痛離游风〇骨躰痛甚及有腫塊作痛者名曰痰塊加乳没硝海石

右煎入濃姜汁服〇頭頂痛加

按治遍身走痛屬濕淡着故因痰而咳嗽或脇痛或肩痛或胸痛者治〇一男有咳痰而背心一點如火灸冷與此湯得卒効



去風順氣活血壮筋又治痢後脚腰緩痛不能行履名曰痢風或兩脚麻痛足腫枯臘名曰鶴膝風一切麻痺痿軟風濕挾虚之候服之其効如神

伽半斤半　芎　芍　仲名一片　羌　蚕　膝　甘各半　附各半片

右入姜棗煎服

按治痿躄之聖藥也此方可治不足之痿弱不可用有餘之風痺前方有證此方有證此方附當著放心二方也〇腰不立身痺痛或痢後鶴膝風專用

之而可也

八丁 解表升麻湯

治遍身壯熱骨節疼痛

柴胡 本 羌活 芎藭
蒼朮 貴朮 甘草 各等分

右入姜葱水煎服

九丁 蠲仙除痛飲

治肢節腫痛痛屬火腫屬濕兼受風寒而發動脈經絡之中濕熱流注於肢節之間而無已也

羌活 一錢 芎藭 假蘇
芷 蒼朮 茯苓 洞利
葛根 各五分 片芩 甘草 各三分

右水煎服○在下焦加滑石

十七丁 治兩手疼痛麻木方

片芩 弓連 羌活
蒼朮 芎藭 甘草
甘草 各等分

右入姜水煎服

一七丁 治兩足疼痛麻木方

片芩 伽南 蒼朮
茯苓 桂枝 利
甘草 各等分

右入姜歷

按二方俱治白虎歷節風之劑

婦人加紅○腫多加洗腹芋湯○脉澁數者加芎藭紅芩片薑

按此方止痛發散之劑

七二 **通氣防風湯** 方見千 腸癰

經中有ニ寒濕一加滴輕加ニ重加ニ
川烏一〇當加ニ升柴一〇有ニ濕熱一加ニ蒼栢一

七三 **治肢節腫痛方**

羊 余各一錢 假 羌搖並蒼
威 芩 洞 利
茸 斤 周各三分 葛 芎各五分

右水煎服一下焦一加ニ栢一〇婦人加紅

七四 **加味四物湯** 治ニ白虎歷節風一

本方虛損加ニ嬰倍一蒼苓茸並遊ニ〇
痛在ニ上一者加ニ枝羌威一〇在ニ下一者、
加ニ嬰離翁栢一〇氣虛者加ニ參朮
龜一〇有ニ痰者一加ニ星半姜一〇血虛
者倍ニ芎斤一紅一



五 **三痺湯** 治ニ氣血凝澁手足痺
澤一風痺一氣痺等一

芪 倍各二錢 掇 仲離枝
細 參 令 斤
龜 芎 搖各一錢 斤 芩 茸 芫

右入ニ姜棗水煎一服

按此方治ニ冷痺之劑
加味益氣湯 麻是渾身氣虛
也宜ニ此湯一

芪 參 伽 貴 斤各一錢
周 柴 蚕各五分 涉 童
芎各八分 枝少許 茸三分

右入ニ姜棗一水煎

七七 **舒經湯** 婦人手足麻痺者ニ

情六欝滞經絡也宜此湯

水煎服

羌活 莎草 蒼朮各等分 枝茸各四分

右入姜歷對水煎服

腰以上痛用食後腰以下痛用食前用

七 八 獨活寄生湯 見中濕

九 七 敗毒散 見傷寒

十 八 補中益氣湯 見內傷

此三方隨証宜加減

眼目

一 八 洗肝明目散 治一切風熱中眼目而赤腫痛

沂芎 蔕 地連 芩

冊 翹 芸 荊芥 蔥

羌 蔓荊 藁本 草決明 茸

右煎食後服○痛不可忍加川烏○有翳障去芎加蔓賊○風熱肝火甚去芎加淅柴○大便實加虎芎桔

按治眼暴赤痛之方也○一男左眼背大赤視黑白不分明此湯得卒効○熱痛赤腫小柴胡湯加虎斤黑豆生不瀉更加芒○暴眼赤初發用升麻葛根湯加蟬與三貼如未退用敗毒散加虎尚不退却用五膈寬中湯酒調下

滋腎明目湯　治勞神腎虛血少眼痛○久病昏暗者腎經真陰之微也如骨翳不欲視物內障見黑花瞳子散皆血勞神腎虛也

斤芍芍　地半各一　桔　參　冊　連芷曼　菊　茸各半　燈心一圖

右煎食後服○熱甚加二游柴○腎虛加栢當○風熱紅腫加翹荄○酒毒加連○翳膜加蜈蚣○按治眼久昏暗之方也



大明散　治一切暴發赤眼怕日羞明隱澁難開熱淚長流腫痛不可忍者或生翳障蠶睛努肉內障昏蒙不問新久并治

斤芍　柳　地　連　荄　冊　翹　蕎麥　芷　假　力　朱　菟　茸

右大燈心水煎服○眼赤腫痛加虎杖○翳障加蜈蚣

養心明目湯　治兩眼昏花流淚翳膜遮睛

斤芊各一芟　七分　栢六分　芍　柳　假　當　甘四分　菟　節各五分　荄

右水煎服〇酒毒加連〇翳膜加木賊〇澁赤加冊

按此方治一切眼疾清涼之劑

## 洗肝散

治風毒上攻暴赤腫痛隱澁眵淚等証

蘭 斤 羌 冊 虎 芸 芎各等分

右熱水調下又水煎服

## 四物龍胆湯

治目赤暴発雲翳疼痛不可忍者

斤 芎 芍 熟地 各一 龍胆 各四 芸 各六分

右水煎服

## 柴胡陽湯

治陰盛陽虛九竅不通青白翳見大小臂及膀胱肝腎經中尚通不通於目

柴 一戔半 羌 揺 其 参 伽 芪各一斤半 芸 芍各二分半 芎各五分 芊 貴 氏各一斤半 桂半分

右水煎服

## 旭黄湯

治眼久昏澁

芊 斤 参 令 連 芩 芸 羌 耳各等分

右水煎服

## 益氣聰明湯

治飲食労役脾胃不定内障耳鳴

葛各三分 芎 参各等分 周

栢各一分 蔓一分半

右水煎服

**敗毒散** 風眼遍用方詳于傷寒

○凡元氣虛弱人或用風藥過多而損元氣者補中益氣湯見虛或十全大補湯見虛或回物湯損虛或加減而可也

## 耳病

**通明利氣湯** 治虛火升上痰氣鬱於耳中或閉或鳴痰火熾盛憂鬱痞滿咽嗌不利煩躁不寧

貝母三分 陳塩泡各二分 精伽倻 地榆 連翹各一分 甘草八分 蜜丹各五分

右入姜煎加灌服

**滋腎通耳湯** 治腎虛而耳聾鳴者

斤芍 雷丸 芎 地骨 梔子 柴胡 芍藥 澤瀉各等分 甘草減半分

右水煎服○胸膈不快加童奴治兩耳腫痛

**荊芥連翹湯** 治

假蘇 芎 芷 川芎 柴胡 奴荅 荊芥 連翹 防風 利



**憂荊子散** 治上焦熱耳內生膿或耳鳴而聾

蔓荊 翁耨門 耳
蛇酒 舡 雪 節各等
右水煎服

九天 桂星散 治風虛耳聾有頭痛

星 芷各四枝 斤 小
陽 翁葵 蜜丹各一
右水煎服○一方去枝加甲水柱

鼻

九七 通竅飲 治鼻不聞香臭

細辛 芸 芜 斤 亏
守桔 陳 苓各一 苛三
右煎食後服
按此方因肺經有風熱而治之若面白肺虛用醫王加門

冊而可

補 按此方治感風寒鼻塞声重流涕

九八 補 清血四物湯 治鼻淵鼻成洒鼽鼻

斤芎 芍 蛇 芩 紅
令 貴各等丹減半
右入姜水煎服○氣虛加滇

九九 宣明防風湯 治鼻淵腦熱滲下濁涕不止久而不已必成齆血之疾

芩 參芎丹各一 芸半 門 冬門 兩
右水煎服
又治鼻淵宣荊芥連翹湯二方見耳門

百

加味清胃散　東垣　專治胃火盛燥唇裂或爲齦唇或牙齦潰爛作痛

升麻　芸　荊　各等分　右煎頻頻噙漱齒齦浮腫痛不可忍是胃中有濕熱加丹參有瘀血者加防風白芷羌活細辛○若牙齦脫而血出者加扁柏葉黃芩荊芥梔子○屢換人牙痛者加黃柏知母人參甘草○若滿口浮而痛不能咬物者加連翹玄參芍藥○小兒牙疼者乳母服加天花玄參白芷○薄酒

百一

補　赴宴散　治三焦實熱口舌生瘡糜爛痛不可忍

連柏芩冊細末各等分　右水煎服

按此方治口瘡外敷之劑厚味唇齒作痛或齒齦潰爛連頭面頸項作痛者并加屏角連翹甘草○胃寒齒痛加草蔻細辛防風羊脛骨灰去牡冊

按治牙齒痛之主方也

百二

加減涼膈散　治口舌生瘡痛

裂咽喉腫痛　薤芩冊連利苛　斤蚰芍各等分　奴

右水煎服

三百 三黄湯 治脾熱口酢

連芩 冊 羌活 芍 伽
利貴 各等 茸減半 分

右入烏一水煎服○凡肝熱口酸而苦小柴胡湯見傷加遊童
○謀慮不決膽虛口苦參要神
茸爲君柴游爲使或小柴胡湯
加門酸棗籙有熱用之○肺熱
口辛宜瀉白散見咳

四百 瀉胃湯 治牙痛如神

斤芍 納 蚘 連 王
冊芸 荊 苛 茸各等 分

右水煎服

五百 當飯連翹湯 治口呻風則痛甚或開口則臭氣不可聞或走馬牙痛三者

斤芍 翹 蚘 連 假
芷羌 芩 冊 奴 茸

各等細減半 分

右水煎服

六百 定痛散 治通牙痛甚

斤蚘 細 永芷羌連
椒苦利梅茸各等 分

右水煎先嗽後嚥下

七百 清涼散 治一切實火咽喉腫痛

桔二 冊 翹 施 苓芸 枳

連斤蛇　芎各一　苛半多

右入燈心細茶水煎服加山豆根一茎尤効○咽喉乾燥加參瑞○咽喉發熱加柴○咽喉腫痛加力玄○痰火盛加扇婁澀○咽痛生瘡加力玄○極熱大便實去結加黒○虛火上泛咽痛生瘡喉不清者加栢霄

按治喉病之主方也

## 加味四物湯

治虛火上升喉痛并生瘡及痺熱毒最能降火甚効

斤芎　栢　雷　瑞各一錢

芍　利　芎各三錢



右入瀝水煎服

按屬虛火者宜此湯

## 通関飲

治喉痺痛腫痛不能言語者但可進藥無不愈者

參　伽　令各一錢　芸　假

苛　永各五分　利二錢　芎一錢半

加附五分水煎服



## 牛旁子湯

治風熱上壅初発牙関緊急已発咽喉腫痛或生瘡癰及愈後復攻胸脇氣促身熱不能言臥

加二錢　芩各等分　歷　升　甲　岑

翁　利　芎各一錢

右水煎服○有熱加蕒貝○肝

火加柴吳連二〇腎火加斤勉畱倍炒〇畏下陷加升〇風熱加假蚤〇下元虛倍附蜜

## 痔漏

### 秦艽羌活湯

治痔漏成瘢下膿不任其痒

羌一各二分　艽各五分　芎七分升　地三分　麻柴各五分　本三分　細紅烙

右煎服



### 秦艽防風湯

治痔漏每月大便時發疼痛如無膿痛煮非痔漏此藥主之

艽各一斤　芎各一斤　防各一斤　風各一斤　羌各一斤　細各一斤　柴各一斤　地各一斤半

右煎服



### 治痔瘡腫痛

連翹　梢各一　槐各一　黃各一　澤各六分　酒五分　虎各三分　陳各三分　柴各二　升各二分　嬰三十　粉紅少

右煎空心服之避風寒



### 乾葛湯

專治酒痔

葛枳守　芩芎各等分　芩　蜕　杏

右每三各入黑豆百粒姜五片梅一個煎服

按治痔漏則宜選四方而用必有數効矣〇痔漏瘺甚咽

乾不食大便結脈弦數與芫
芸湯而安○飲酒之人痔瘻
出而瘍甚下血與乾葛湯得
卒効

補 當歸連翹湯 治痔漏

斤 芫 芸 芩 假 並
芍 蛇 冊 伽 參 參
卯 各等 甘 草 半

右入梅塩水煎服



秦艽當皈湯 治痔漏大便結
燥疼痛

虎 四錢 芫 尾 洞 各錢 芋 斤
皂角 伽 各五分 紅少 嬰 二十

右水煎服



○凡陰精損者補中益氣湯見內傷十全大補湯見虛上之漏証氣血損者亦治法同之

補 脫肛

參芪湯 治肛門翻出

參 芪 斤 蛇 伽 芍
令 錢各一 周利 貴 各五 甘 炙 三分

右入姜棗水煎服○虛寒加赤升陽除濕湯而竭之



升陽除濕湯 治下而上者引

柴 升 芸 猪 羊 脊
貴 曲 牙 甘 各等分

右煎服○胃寒腸鳴加益守
○凡勞倦房欲過多及產育用

力久痢久瀉小兒吐吸耗氣俱有此症宜參芪苓斤升水煎服血虛加芎歸虛寒加茱黑妙氣熱用條芩六兩升一兩麵粉九服○血熱四物湯加栢升方見虛損○風邪敗毒散可也方見傷寒○肺與大腸爲表裡肺熱則肛門閉結肺寒則肛門脫出必須温肺蔵補胃宜補中益氣湯加詞椶少許方見瘧○挾濕熱者升陽除濕湯方見干泄○有兼痢者四物湯方見虛損加槐花升

## 癲癎

治癲屬氣血虛



而兼痰火者加竹瀝薑汁胆礬清火化痰除瘀鼈諸癎之疾

沂沙　伽　苓　陳守

實　蒺藜　菖　連　菝　絡石門

芍　參　遠　絡六　甘　卅

右入姜煎服

拨氣血虛而痰火上必胸故爲瘀鼈爲癲徃此方主之○百不如心故詳聞眞獨而人而高聲語或怒或罵皆與此湯得數奇○産後血暈心悸多汗熱甚言語錯亂目見不實與此湯而安

## 治因驚懼發癎

病攣擲痰遊有聲耳多白睛強
[illegible]背一時許脈沉微而急方醒
後無見鬼者大人即發多服犀牛
腦麝鎮墜之藥已四年餘此證
尚在又漸行步動作神思如痴
先灸兩蹻各二七壯次服此藥

葛根 搗細 芎 芍藥 附子 各三錢 川烏 烙二片 甘烙一錢半

右入姜煎服

按救癲癇壞證之劑〇一人
足厥冷則有小腹差上心胸二
物而煩悶或臍塞而心中沉
悶如欲絕或食遲則無



## 清心化痰湯

治精神不守譫
妄不常言語錯亂妄見妄記發
高聲罵詈

黃芩 連 沂 牡
貝母 守 陳 苓
芍藥 酸炒 薑烙一 甘分二

右入姜煎服

按治一切癲疾之主方也



## 養血清心湯

治癲病喜笑不常顛倒錯亂者

加味逍遥散　治婦人癲疾歌哭無時躁擾上屋者乃營血迷亡所致也此湯主之

柴胡湯加地辰用

右入煨姜一片水煎○有熟者小

斤　芍　伽　葉　嬰　一方

加味二陳湯　治一切痼病

令星貴各一　蔓　洞



參伽苓　葉　酸妙各

地　菖蒲各一　斤半　芓五

右水煎

按此方補虛化痰清火寧心之劑主癲狂喜笑不常



利　丹　守　苓各一芓

蜜　辰各五分

右水煎入瀝對服

○凡癲疾喜笑不休者是心火之盛也黃連解毒湯加守瀝對用方見傷寒

結核　附瘰癧馬方寿

五香連翹湯　治一切惡瘡結核瘰癧癧瘟惡毒

滴三兩　薄荷　升　無用寄升麻

撚　通　乳各分　三　青　木各一分

芓各一　麝半分

右煎室心服利下惡物為度



補抑氣內消散　治瘰癧芓諸

瘤結核

斤芍　芍
田利　羌　各八銖　芫　本
各一兩　水一兩半　蜜
泉三銖
右水煎服

消解散　治咽喉結核腫塊如
桃腫硬疼痛頸項不回轉兩腋
下或有塊硬如石
星月貴　洞利柴
西連莞　蒴芸搖
白附輒　茂蔓翁　芎
各等分



右入姜燈心水煎服

內消散　治梅核痰核馬刀瘰
癧如神
斤莞　羌
並　耨　各一兩　芫一兩半
各八銖　本　芍　芎
右水煎服



益氣養榮湯　治膿抱和潰瘰
癧流注或四支患腫肉色不變
或用補發熱或潰不斂
芪　參　伽各一銖半　斤弓
芍　蛇　貴　莎　佰各一銖
柴　利　錄　芎
右水煎服○有痰加貴○肋下

刺痛加童溺〇午後有熱或頭
微腫加稍炒〇腫水濕倍參芪
斤〇女人有胃氣胸膈不利倍
芍倍〇月經不通加王瓜
方見于瘡瘍

## 十六味流氣飲

### 折傷



## 導滯湯

治打撲損傷內有瘀
血爲痛爲腫爲
大黃 芩 柹 牡
各一兩 各一兩半 近一兩 各十二兩
右水煎服加酒蒸大黃一兩尤効
〇治被人打死或踢死灸百會
穴三壯立甦
按治跌傷之主方也



## 通導散

治跌撲傷損極重
大小便不通乃瘀血不散肚腹
膨脹上攻心腹悶亂至死者先
服此藥下死血瘀血後可
服補損藥不可用酒煎愈不通
矣亦量人虛實而用
虎杖 芒 牙消 各二兩 朴 斤
貫衆 翁 紅 各一兩半 牛五分
右水煎服〇此藥妙爲未產婦小兒勿用



按胃方

一錢熱酒調下被蓋汗出即愈
與傷寒可交考

## 補破傷風

## 羌活防風湯

治破傷風邪初
傳在表

羌芸芎本斤余
各一𠆢 細切 各五分
右水煎服〇蘇加虎〇大便秘加虎

## 白朮湯 治破傷風大汗不止筋牽手足攣攣

芍藥四錢 伽羅 甘草各一錢五分 羌活各二錢 升麻各三錢

右水煎服

## 大芎黃湯 治破傷風在裡

芎一兩 羌活各一兩半

右水煎服以利爲度

## 中毒

### 解諸藥毒 浪蟲毒

黑豆 荒 甘草等分

右每七冬水二十盞煎八分溫服

### 升麻湯 治桃生毒

起而生瘡瘡狀如癰此乃桃生毒也升麻爲末取冷水調二三冬遍服之若瀉泄加薤數莖根鬚其腫癰消宜煎平胃散調補兼進宮粥

### 解砒毒

此毒於肉飯中得之則易治飲漿中得之則難治若胸脇偏痛則此之若腹作偏則急瀉之徐服參苓白朮散無妨

### 巴豆毒

其證口渴臟赤五心煩熱利不止永炮蓮妙等分

爲末每三錢凉水調服又寒
水石磨水服
百四十一 雞猴毒 用灣蘭葉搗汁飲之
乾者爲末自湯下
百四十二 野蘭毒 用甘草不拘多少以
麻油一盞煎數沸冷服
百四十三 河豚魚毒 倉卒無藥急以清
油多灌之使毒物盡吐出爲
愈或以自糞爲末調湯服
按右方雖未試而備倉卒之
捷覽者也
百四十四 解諸草毒 治誤食毒草并
百物毒殺人亦必死板藍根四
兩貫衆青黛生甘草各一兩爲
末蒸餅九梧子大別用青黛爲
衣如覺精神恍惚惡心即是誤
中諸毒急取十五丸嚼爛新汲
水下即解
百四十五 解豆腐毒 過食令人生瘡愛
氣遺精白濁用生薑煎湯服
或子煎湯亦可
百四十六 解諸菌毒 掘新地取真黃土一
以冷水攪之令濁澄少傾
取飲之可解亦治楓木菌食之
令人笑不止又方用荒花生爲
末每一錢新汲水下以利爲度
菌之毒者蓋因蛇虫毒氣薰蒸
所致

### 解六畜肉毒

一碗服之○食自死六畜毒用
黄柏末一二錢服之不解再服



### 解中諸物毒

爲末每三錢新汲水調服得吐
即効未吐再服或萬病解毒丸
下之



### 誤吞鉄針

用蚕豆煮熟同韭
菜嚼下針與菜從大便而出



### 誤吞銅銭

不能化者用砂七
煎濃汁飲之其銅自下或用荸
薺研爛服之其銅自化或用堅
炭爲末米飲調服亦大便中原
下如烏梅狀



### 誤吞蛭蚘

用生猪血令病人
喫須臾生清油灌口中悪心其
蛭蚘衆在血中吐出繼以雄黄
爲末冷水調服



### 誤吞水蛭

用田中乾溷一小
塊小死魚三四个將猪脂溶攪
熟用巴豆十枚研爛入泥内爲
丸小兒三五丸須臾大小水蛭
一時皆下却以四物湯加芨煎
服生血補脾



### 骨硬入喉

用砂糖等分爲末
以綿裹少許噙之良久骨隨漿
出甚者用南硼砂少許水洗汲
口中含化立愈一方用金鳳

花子或根嚼爛啗下咽骨化用温
水漱口免傷齒雞骨尤効○魚
骨硬食欲欖或以楸為末煎流
水調服外用猶爪爬之自下○
獸骨硬用象牙搥磨水嚥下或
桑木上虫屑米醋灌自下或猶
涎漉之以狗善食諸骨也和苦
刺喉○或口舌中取鵝涎灌之
即下以鵝善消稻芒也

## 犬咬

風犬咬用芸五錢牽牛
犬黃各三錢猫一錢麝香三分
雄黃二錢半為末每三麦遇傷
時滾水調服利下惡物從小便
而出

## 蛇咬

用細辛白芷各五錢雄
黃二錢為末每二錢入麝香少
許溫酒調服○誤飲蛇交水研
雄黃服之

## 鼠咬

猫毛燒灰入麝香少許
津液調敷

## 蜈蚣咬

用雞屎塗之良

## 黃蜂螫

用熟油洗之清油擦
之亦可或用頭垢敷或以塩擦
亦可

## 癰疽 附疔瘡

### 十六味流氣飲

治無名惡瘡瘤癤或癰疽

斤芎芍　　杜仲
　　薤　　桂參
　　蘞　　朴梔
　　芸　　芩

右煎服〇乳巖加薑〇瘡後餘毒氣流於陰陽脾經則瘡發四肢手腕並膝臏而腫痛宜此方若氣血虛而自利加附大便實加虎

按此方善消無名腫毒〇痛癢或手足凸腫其色赤雖經二三年而戴汁不膿世俗謂之氣腫此湯主之〇乳房中有如小石物而痛名乳核或作旅岩而出膿血甚痛加童時人有大驗〇一人患癮癧寒熱往來此湯而安〇一人右目下有結核攻之則自膿出膏與血與此湯三劑而愈〇壽法印云婦人乳房腫痛太惡寒戰慄世俗謂之乳風此方有數効



### 來蘇返魂湯

治流注瘡瘍跌撲傷折非此不能効至於救壞病活死肌聊患於未萌之前拔於既潰之後此藥大能順氣

氣血故也癍痘真神仙劫劑

散不犯鉄　斤　通草　並

薤　葱　根　各半

右酒水各半煎服嗽流注加獨活在上食後服病在下食前服○加有潮熱渴躁有寒邪未盡散加升蘇葛此而熱不退加葛○頭痛加芎姜○氣血盛者減斤○胃寒生痰加半夏○熱鬱而成風痰加桔姜○腦痘發於在上者或老人虛弱者並去芎葛○如有瀉者不可用宜瀉止而後用之

按治瘡疽之主藥也

癰疽疔腫初



發表熟似傷寒表毒輕者消散方見干葛解肌湯

或宜防風通聖散方見干中風

成者速散已成速潰

治癰疽瘡癤未

芪　參　斤各二兩　芸

利　並　外

一方加銀　桂　甘各一

右爲末每服三錢黃酒調下不飲酒木香湯調下亦可○癰疽腫痛倍芪並不腫痛倍芪○不進飲食加砂仁○痛甚加乳沒○水飲乾加倍當歸○瘡不斂加皂刺○咳加半貴杏姜○大便閉

加罌奴○小便澁加愛茶翁燈

## 和裡散　治癰疽気血虚不能起發腐潰收斂或悪寒發熱肌肉不生

參芪各二伽　當歸　芎藭各一戔半甘草一戔

右水煎服○燉服腫熱毒加連○漫腫氣虚倍參伽○表邪加羌○內熱飲冷加桂○腫赤作痛血凝滯也加乳香○肉赤不斂血虚有熱加芎王○肉黯不斂陽気虚也加參芪桂斂○肉白不斂陽氣虚也倍參伽芎○忿怒膿熟出血肝大血虚也加主冊芎○面青脇脹出血肝虚不能藏也加預茱女○食少体倦脾虚甚也加參伽姜附○膿多帶赤血虚也倍參芪介

胃虛也加人參伽〇少食腰痛
腸鳴冷海脾虛寒也加炮姜蜜
〇膿多作渴氣血虛也加熟地
玄門〇韮痛漏濕精肉敗也加
預菜芋〇勞役漏赤氣下陷也
加升柴〇目瞤頭痛眩暈陰血
虛也加熟地〇身熱思衣欲投
水中脈沉微細氣脫發躁也加
附桂〇瞤熱多痰肥血虛也倍
斤芍參伽〇善思休痛不寐盜
汗肥血虛也加神酸〇腹痛汗
出腎氣虛也加玄〇飲食汗出
胃氣虛也加參伽支〇嗜臥飽
而益汗宿食也加參伽守〇婦

人勞怒夜熱或譫語或遺經行
熱在血分也加柴地王

## 當歸羌活湯　治腦疽

斤芩　連各二酒　煮
芸　羌　甘　丹各一撮
本各七分　芋五

右水浸良久入酒一匙煎熱服
日一次三日盡六服卻將藥滓
汁調下瘡洗末各三錢因膏漿
熱蘸者宜食窮寒濕者少用

## 神中益氣湯　治元氣虛損或

因寒伐惡寒發熱肢体倦怠飲
食少思或不起起發消散生肌
收斂或兼飲食勞倦頭痛鼻熱

煩燥作渴脈洪大弦虛或微細
軟弱（方見于虛陽）

四君子湯 治脾胃虛弱或因
飲食勞倦或因憂思或因怒氣或因
痰飲或因酒色或因瘴瘧或因吐瀉
或因痘疹或因瘡瘍或因產後或因
久病或因誤服攻伐寒涼藥餌或因
七情六淫或因風寒暑濕或因飲食
生冷或因房勞過度或因勞役過傷
或因胎前胎後或因小兒初生或因
老年衰邁凡脾胃虛弱飲食少思
或食而難化或欲作嘔或大便不實
若脾胃氣虛蓄白出或吐血便血
血脫血崩血枯血燥之類皆宜用之蓋氣能
攝血故也凡氣血俱虛之症宜
此湯俱加斤脾胃已壯飲食自
進陰血自生若用四物湯沉陰
之劑脾胃復傷諸症蜂起若余
門火衰而脾土虛寒必用八味
（方見于虛損）

八物湯 治脾胃虛弱或因
熟煩燥作渴或瘡瘍潰後氣血
虛損膿水淋漓稀久不能愈（方見于虛損）

十全大補湯 治癰疽瘡潰後補
氣血進飲食實爲切要凡膿血
出多陰陽兩虛此藥有迴生起
死功（方見于虛損）

竹葉黃芪湯 治癰疽氣血虛
胃火盛而作渴

竹葉二錢 芪 門冬 半夏 參 甘草 各一錢 生地一錢半

右水煎○若大渴發熱或泄瀉

淋閉者、邪火內淫一惡也竹葉
黃芪湯気血俱虛八物湯加芪
門玄茱如不應佐以加減八味
丸一〇若膿血既泄腫痛尤甚膿
色敗臭者、胃氣虛而火盛二惡
也人參黃芪湯如不應用十全
大補湯加門玄一〇若目視不正
黑睛緊少白睛青赤瞳子上視
者、肝腎陰虛而目系急三惡也
六味丸加冊門玄如不應用八
物湯加冊愛玄一〇若喘粗短氣
恍惚嗜卧者、脾肺虛火內惡也
六君子湯加蔥姜如不應用補
中益氣湯加門玄心火刑尅肺

金人參平肺散亦見于陰火傷肺門
肺、六味丸加玄一〇若肩背不便
四支沉重者、脾腎虛損五惡也
補中益氣湯加茱萸玄如不應
用十全大補湯加茱萸玄一〇若
不能下食服藥而嘔食不知味
者胃氣虛弱六惡也六君子湯
加蔥砂如不應急加附一〇若声
嗽色敗唇鼻青赤面目四支浮
腫者、脾肺俱虛七惡也補中益
氣湯加蔥姜如不應用六君子
湯加炮姜更不應急加附或用
十全大補湯加附炮姜一〇若腹
痛泄瀉咳逆腎憤者陽气虛寒

氣內滯之惡症也急用托裡溫
中湯後用六君子湯加附或加
姜桂○有汗而惡寒或無汗
而惡寒口噤足冷腰背反張頸
項勁強此氣血虛極變症之惡
症也急用參芪斤窠附救之間
有可生者○若有潰後發熱惡
寒作渴或怔忡驚悸寤寐不寧
牙關緊急或頭目赤痛自汗盜
汗寒戰咬牙手撒身熱脉洪大
按之如無或身熱惡衣欲按放
水其脉洪大按之微細衣厚仍
寒此氣虛極傳變之惡症也○
若手足逆冷肚腹疼痛泄瀉腸



鳴飲食不入吃逆嘔吐此陽氣
虛寒氣所乘之惡症也○大抵
五善見三則吉七惡見四必危
虛中見惡症者難治實証無惡
候者易治

**五聖湯** 治一切癰疽疔腫初
覺憎寒頭痛
虎 銀 甘各一兩 薑一兩 刺三兩
右入薑一兩酒煎服○一方去刺
加乳香 沒藥

**補 便毒** 附下疳楊梅瘡

**龍膽瀉肝湯** 治肝經濕熱或
囊瘡便毒下疳懸癌腫痛煩作
小便澁滯或婦人陰癢痒痛或

男子陰挺腫脹或出膿水洗症見方

百七一

**蘇方散** 治便毒

木鱉 斤半 炙 並末 芎 芍 貝母 銀 虎 穿山甲 炙 沒藥 各等分

右水酒各一盞熬熱煎

百七二

**兩解湯** 治便毒內攣熱氣挾寒邪精血交錯腫結疼痛

桂 虎 芍 各一錢 羌活 五分 芎 二錢 甘草 二分

右水煎服

百七三

**治癆敗毒散** 專治下疳瘡

柴胡 一錢半 芫 甘草 各六分 荊芥 各七分 連翹 各七分 防風 各七分 羌活 各七分 假蒼 各七分 桔梗 各七分 枳殼 各七分 薄荷 各七分 牛蒡子 各九分 甘 三分

右入燈草二十四根水煎服○有便毒量人虛實加減

百七四

**補心湯** 治婦人陰戶生瘡或痛或痒如虫行狀膿汁淋漓陰

參 苓 醴 田 弓 各三分 半一兩片 芍 各二錢 貴 妙 各一錢 水 利 永 各五錢

右入姜棗水煎服○如濕熱有虫者去姜水利加苦艾嬰栗連翹

百七五

**一方** 治外腎腫脹痛甚

茴 蝎 穿山甲 蜜 各等分

右爲末酒調下

百七六

**消風敗毒敗**

楊梅瘡初起宜

此湯

片弓 防風 各一錢 荊芥 各一錢半 連翹 桔梗 炙甘草 各一錢 羌活 獨活 各五分 銀花 各八分 芸苓 各五分 退ケ 二十

右水煎服

## 二十四味風流飲

瘡毒發出

宜此湯一

芸苔 荊芥 連翹 桔梗 炙甘草 各一錢 羌活 獨活 各五分 退ケ 二十

上部瘡多倍加 薄荷 葉 各下部瘡多倍加

纔五 加 銀花 刺多慧蟲 各一錢 皆 銀 刺多慧蟲 各一錢 蚤 桔梗 炙甘草 各三分

右劑依五十劑水煎服○瘡痛加羌活○體厥加參令去卅



## 還天再造散

瘧五 刺 虎骨 各一兩 白朮 六錢半炒 半生

右爲末每服五錢日未出時無灰酒下

## 癇風

### 治癇風

東面服之當日必下惡物或臭不可近

或蟲或膿如虫口黑色乃是多年赤色

乃是近年數日後又進一服無蟲乃止



## 瘡疥

### 升麻和氣飲

肢節痒不當甚至增寒發熱陰

卞濕痒虛人宜服此

升麻 葛 芷 陳橘皮 各一錢 甘草 炙 各一錢半 桔梗 防風 各一錢 荊芥 各七分 羌活 各九分

右入二姜煙草煎服

拔治癥瘕之方也

赤小豆湯 治年少血熱遊生瘡瘍變爲腫滿或煩或渴

赤豆 炒 斤 商澤 趙 揩 桑各等分

赤芍 薤 揩

力入姜煎食遠服○熱甚加犀

○一方有澤漆

拔治血熱腫滿之主方也○當世之小瘡多生手足至三遍侈太痺或痛故以熱湯洗之則變爲腫滿喘呼氣急煩悶小水赤澁或大便結加棟其



得勿難勝言○產後遍身浮腫喘欬氣急小便澁少去翹加芎腹陳苓姜七小貼而愈○或語云瘡後有此症加犀而安

活血四物湯 治諸瘀經年不愈

介弓芎 地各一斤 芫連芸 芎各六分

方八分

右水煎服



千金消毒散 治一切惡瘡無名腫毒發背疔瘡便毒杭發脈洪數弦實腫甚欲作膿者

亮芩 各二錢 介 銀各二兩 刺蒺藜 各三錢 瑞虎芒

右酒水各半煎服

百八十三 酒歸湯 治頭瘡

介 伽各一錢半 滲 涂芎 貴各五分 蒼耳 淀各七分半 淵 各四分 芸三分 水煎

百八十四 龍子清肝湯 治三焦及足少陽經血虛肝火鳳熱耳內作痛或生瘡出水或頭項胸乳等處作痛或寒熱瞤甚自汗口苦或目居槍動等証 柴 卅 本名各一錢 王 各一錢 令芎 余



介 加各七分 北芪 各一錢 右水煎服

洪實卅 治一切無名腫毒散血消腫及湯盪火燒金瘡打撲血出不止並效

瑞三兩 芷三兩 芩二兩 黃一兩

右爲末熱毒用黍調冷用酒調塗患處○叙血不止冷水調塗後頭項上此藥最絶血路



隔蒜灸法 治一切惡瘡毒大腫或不痛或疼不痛不痛者灸至痛者灸至知痛而止其毒隨灸而散蓋火有暢達之義此從法之法必大有回生之驗

金瘡

四物湯　治金瘡出血過多

本方加參芪方見虛損

○凡金瘡治法者扶中氣以補氣血（之）清（之）血（之）熱（之）為本（上）撰（下）補中益氣湯見內傷四物湯四君子湯八物湯十金大補湯四方共見虛損等諸方隨症可為加減之

合類增損衆方規矩卷之五