




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

戴曼公治痘秘中之真秘


寛政四年 池田瑞仙識
唐古當候大 廣三十六吉五死吉四及附錄卷




10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 30 9 8 7 6 5 4 3 2 1 20 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1m 2 1 0




6 5 4 3 2 1 30 9 8 7 6 5 4 3 2 1 20 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 1m 2 1 0





唇常

之候



唇八

之圖


滋潤



潤



淡




紅

○唇紅潤而不燥裂惟乾紅者
樊輕而毒少也如黃白紫赤
而不潤澤者凶也

○唇淡紅或淡白舌亦合格者氣虛也汗
多者表裏俱虛也不可用攻發候其放
苗以宜補益

口

○唇口者肌肉之本也與五內相通故觀於此可以預知內證之吉凶矣痘毒之癰
色唇口舌之三要紅潤身樊音声清睡臥安常睡中微悸吐瀉一兩行神氣清爽
樊微毒稀必不可過表散



唇赤如火或如金朱而
雙唇發紫黑者此乃脾經熱
極也此名曰赤珠繞唇宜急清火
解毒

痘出而諸症順候無故但至六七日一月當於卯寅戌
酉之間帶水光者欲虛寒之兆也急宜溫補遲則作
溏泄而表瘡必倒陷九日十二日死




唇赤色或紫赤於嘴角現一粒黑痘或見異痘獨大者此曰單鎖口若唇上
下一圈成串者此名騰蛇鎖口又唇之兩嘴俱現一粒者此名雙鎖口又名白
虎鬚瘡皆惡候也治法有訣

唇赤色乾紅紫赤而燥裂則譖語狂燥
大小便秘結者為內實或為熱毒壅急用
寒冷之劑宜攻其大便候其色以重又攻
之有訣



唇嘴崩裂或腫大口去臭氣者此胃爛發斑也
不治如唇紫赤堆腫口中腥臭衝人者此邪火煎
熬肺爛胃敗也必死

一發熱氣血平則唇舌鮮紅滋潤而肌膚發黃紅色者為平和否則唇紅變赤是則為火
為紫虛則紅變淡是則為青為白變則為乾淡為燥裂為敗血虛寒則為褐色醬色水色
虛冷為灰黑陰陽俱虛則為純白純灰純紫純青純藍純黑者死矣陽氣已欲脫兼水之化
經曰純陰者死矣



一發熒唇上先腫大如嘴尖紫赤乾燥者
寒熒毒盛也先用雙解清涼之劑猶加口臭
者不治

唇先發瘡如堆粟者脾氣破敗死莫治如唇上
牙林先出痘不見他痘者死



枯焦黑死

離

死




瘡去而稠密至六七日期

諸瘡欲膿而唇上痘先黃

硬者脾絕也不治

唇水色者至膿期唇淡紅或淡白帶水光
膿流濁水者若與舌俱紅淡白者虛寒
之至極也急宜峻補



● 唇上痘去相連諸痘未癰而唇痘
先黃熟者亦內潰已成他處亦難成
癰矣更有氣血下陷毒攻脾胃死

黃 熟



離 格

離 格




胃絕

淡 乾



格離

● 唇白至舌者為內潰三日六日死者為實熱九日十二日死者
為虛寒治者可知異其症



一癉熱舌乾燥者內火太甚
急宜清涼涼血若大便秘

燥



者雙解之

赤 紫



若大便秘者攻之

一癉熱無胎紫赤者熱毒熾盛
或血熱血毒太甚宜清涼解毒

●癉熱四五日雖大便秘結
妄不可下之在後多易

青

白


惟宜補脾溫補

●癉熱悠悠舌苔淡白者向
來諸症悉屬虛先可知三禁

紫

灰

虛寒



陽舌古之三十三圖

乾 紅

燥 裂



○燥裂者火毒在血中如大盛則血燥亡津液竭肌肉乾枯瘡色乾滯枯濶冒
液焮爛之兆也
但雖有陽舌十三種又加增舌上黑痘之一舌共十四舌也

白胎

通明

芒 刺



白胎通明者內火太甚峻
宜清涼解毒若大便秘者

見點一二日熯毒熯者白胎生
黃刺內火愈太甚則自黃而


下之慎忌投參葛殺人有
訣

斐紫黑宜清涼



乾紅無胎者血瘀也瘡色肉地必赤色而頗腫治宜清漑涼血之劑如大小便秘

者微利之



舌三圍赤色如火中央白胎如積粉中心凹而焦黑者五內梟炎燔灼急峻宜寒涼之劑候大便利有訣

舌



焦



紫



炕

焦紫者梟毒肆逆毒裏俱實誤失下則必死此氣血自為火熱所煎熬急宜清涼攻下

清涼攻下

白胎



胎


黃



乾黑

自白而變黃者胎之常也如黃胎未老則毒火太甚如去膏後胎中微黃色滋潤者內火自解之兆也急宜補托

舌常候



舌 八

痘者兼見八症之一二而不離八舌之一癰癧見苗之候用藥之為繩墨也。有訣

一、癰熱舌淡紅而潤者氣虛也不可
發其表若便利而後淡紅者宜補


一毫熱舌淡紅而潤者氣虛也不可
發其表若便利而後淡紅者宜補



赤 紅

益溫補

圖



● 黃黑胎者從白而黃從黃而黑則熱毒愈盛也舌中帶黑色乾燥者宜

清涼如潤滑者忌之

黃黑

兩白

胎

胎



● 西白胎者滋潤則裏毒已解表實未除二三日雖便祕必忌妄下四日後行下則多虛寒

胎

胎

●

● 黑則津液竭之兆也宜溫補

●

● 灰紫黑者三圍赤色中央乾紫黑者屬熱宜清涼若三圍淡白中央乾紫

灰紫

兩黃




舌根
灰黑

●

● 西黃舌根灰黑者二三日大便秘者微利之如泄而後宜補托溫補之類四日

後忌行下有訣



黃紫黑灰白者俱皆乾燥不潤舌尖赤色為熱實若便泄後滿舌滑潤者

為虛

三積

黃

胎

老



●黃老而乾燥者內火未解也去存後黃中帶微黑三圍紅潤中央滑潤者
邪火自解矣急宜參芪補托百訣

●斑點舌瘡中未見此瘡瘡後往往有此必屬脾熱餘炎未除宜清涼預
防走馬瘧

班點


舌上



舌

黑瘡

●舌上生黑者氣毒熾盛邪火伏于心中不消則先舌上生黑珠至去存期又發焉
此症者十無一生至七八日而失血必十二日死勿治



○但雜有陰舌十三種又加增內瀆之一舌共十四舌也

●舌清潔者瘦中首尾成羨候無雜症必莫用湯劑如誤失治則其變易虛寒三四日宜補托立六日後宜溫補如唇舌滋潤者雖有急症切忌妄下殺人

陰舌三十之圖

清



淡



白



潔



○

●舌淡白而滋潤者初發不抱於時宜補益又忌用攻癰至四五日失起癰之勢者欲虛寒之兆也急宜溫補如加溏泄者宜峻補

●舌中央微灰色三圍紅潤者氣血津液微虛之徵也當立六日期為此舌者

必無妨惟宜補益溫補

中央微

淡




紫

灰色

●舌淡紫者二三日微用清解四日已後宜補益六日後宜加溫補便一泄則

必虛寒矣



●舌滋潤生淡白點者於見苗去脊之間大便一泄則必虛寒之兆也。一泄則神氣自虛。熱氣自散。此痘之常候也。如六七日期加咬牙者宜溫補如瘡色灰白急宜峻補。

淡白



點

虛冷



淡白



●舌淡紅而虛冷者內氣虛寒宜溫補如淡白虛冷者內外俱虛寒六七日後加寒戰咬牙者全體髮膚無所不寒此名謂純陰無陽峻用峻補之劑而陽氣猶脫者不治他無治法矣

灰



黑

舌心




微黑

●舌三圍紅潤中央灰黑者一二日癰之去脊後唇舌滋潤宜補益溫補如三圍

淡白中央清潤急宜峻補

●舌心微黑而滋潤者去脊後預防泄瀉如腸鳴下氣者不可虧溫補



●舌瘦薄者去瘡癰齧諸症遷變為膿雖氣血困沉調理不失節故漸免
鬼錄雖得生氣血未復之兆也不可虧補益十五日後少加解毒

瘦



青藍



薄

●舌三圍紅淡中央青藍色者木氣壯而冠土向未伤泄泻之危惟宜調

養脾胃如瘦色淡白急宜溫補

色

糞
蜂


熟
腐



●舌如糞者原去瘡癰舌上為堆粟者至五六日則口內咽喉去瘡癰

必癰瘍水錯喉食飲不入者死

●舌如蜂者舌心紅者十數二三如醬色或獨色或淡白者不治



●舌失采血者痘中不見之痘後氣血虛耗心肝俱受傷或瘡前失血或婦人痘中墮胎者間有此症宜補養氣血

失



純



白

●舌純白者為內潰唇白至舌苔白至唇雖有先後必死勿治三日六日死者

為寒發九日十二日死者為虛寒

榮



潤



濕

●舌濕潤者邪毒鬱伏于內不溲則府內薰積似齧熟濁色如泥土全無紅

色者死不治

紫黑



三圍赤

●舌三圍赤紫黑而中央純黑刺者

熱極也死

短縮者死



●舌乾淡褐者死

卷縮者死

○已上五舌必死之候也

右唇舌常候十八
舌二十六舌五死舌圖及附錄二
卷乃戴曼公治瘉叢中之真秘也今手圖附與長府
醫官管子卿母妄教人蓋有斯資而有斯鑒有斯鑒
而有斯藥矣苟傳非其人則大傷人命且誤神方勉
哉勉哉青出於藍而青於藍非弟子擇師師實擇徒
子

寃政四年壬子六月 錦槁老人池田瑞仙識



30/1814.

