



6 5 4 3 2 1 30 9 8 7 6 5 4 3 2 1 20 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 1m 2 1 0



丹溪心法附錄卷之七

濕門

痞二十

丹溪心法

○痞者有食積無濕 東垣有法有方 心下痞須用枳實炒黃連 如稟受充實而蒼骨露氣實之人而心下痞者宜枳實黃連青皮陳皮枳殼 如稟受素弱轉運不調飲食不化而心下痞者宜白术山楂麴蘖陳皮 如肥人心下痞者乃是實瘀宜蒼朮半夏砂仁茯苓滑石如瘦人心下痞者乃是鬱熱在中焦宜枳實黃連葛根升麻 如食後感寒飲食不化心下痞宜藿香草豆蔻吳茱萸砂仁 痞挾血成窠囊

用桃仁紅花香附大黃之類

入方

吳茱萸三兩湯浸 黃連八兩

粥糊爲丸 每服五七十丸白朮陳皮湯下

王液丸

軟石膏不拘多少 又云火煅紅出火毒

右爲末醋糊丸如菉豆大服之專能瀉胃火併治食積痰

火

附脉理

脉訣舉要曰胷痞脈滑爲有瘀結弦伏亦痞濇則氣劣

附諸方

枳术丸脾胃論治痞消食強胃

枳實去穰炒 白朮去梗

黃色一兩

二兩

右同爲極細末荷葉裹燒飯爲丸如梧桐子大每五十丸多用白湯下無時白朮者本意不取其食速化但令人胃氣強不復傷也

橘皮枳术丸脾胃論治老幼元氣虛弱飲食不消臟腑不調心下痞悶

枳實麸炒去穰 橘皮一兩 白朮二兩

右件爲細末荷葉燒飯爲丸如梧桐子大每服五十丸溫水送下食遠夫內傷用藥之大法所貴服之速入胃氣令胃氣益厚雖猛食多食重食而不傷此能用食藥者也此

丹溪心法附錄卷十
藥久久益胃氣令不復致傷也

○廣按上古用一藥治一病至漢張仲景先生用群藥治一病雖然用群藥治一病亦不過三五味而已其間君臣佐使分兩不同主治引經秩然有序非若後世之效驗者一方用至二三十味尤未已也丹溪云予每效仲景立方效東垣用藥庶乎品味少而藥力專精也此枳木丸乃易老張先生之所作觀其用白术二兩以補脾用枳實一兩以消痞至東垣李先生加陳皮一兩以和胃一補一消簡而又當真得立方之指趣也

橘連枳木丸古庵方補脾和胃濕火消痰

白术三兩去梗 枳實一兩去穰炒 陳皮一兩 黃連一兩酒浸炒

右爲末荷葉煮湯打米糊爲丸如梧桐子大每服五十丸食後服

○廣按金易老張先生定枳木丸方用白术二兩以補脾枳實一兩以消痞取其補多而消少至東垣先生加橘皮一兩以和胃名橘皮枳木丸則補消相半也予今用白术二兩枳實一兩陳皮一兩黃連一兩名橘連枳木丸仍補多消少又兼清熱也丹溪云心下痞濕用枳實炒黃連是矣

平補枳木丸古庵方 調中補氣血消痞清熱

白术三兩半酒浸炒 白芍藥一兩半酒浸炒 陳皮 枳實去穰炒

苦楂各一兩

人參

木香各半兩

右爲細末荷葉煮濃湯打米糊爲丸如梧桐子大每五十

丸漸加至六七十丸食遠米湯下

○廣按此方用白术三兩以補脾氣爲君用白芍藥一兩伍錢以補脾血爲臣用陳皮一兩以和胃枳實一兩以消痞炒黃連一兩以清熱爲佐用人參半兩以補元氣木香半兩以調諸氣爲使如此平補氣血均去瘀火熟通氣道則病邪日消而脾胃日壯矣

枳實消痞丸 治右關脉浮弦心下虛痞惡食懶倦開胃進食

枳實 黃連錢各五 乾生姜錢半夏錢厚朴四錢
人參三錢 甘草錢炙二 白术三錢 茯苓 藜芽錢各二
右爲末水浸蒸餅丸如梧子大三十五丸溫水下

消痞丸 拔粹方治一切心下痞悶及積年久不愈
黃連 炒六錢 神曲炒五錢 黃芩 刮黃色 姜黃
白术各一 人参四錢 甘草錢炙二 緩砂仁錢
橘皮四錢 乾生姜錢 猪苓二錢 枳實錢
一方加澤鴻厚朴各三錢 半夏湯炮七次五錢
右爲細末湯浸蒸餅爲丸如梧子大每服五七十丸至百
丸白湯下

黃連消痞丸 拔粹方同前

黃連炒一兩 黃芩炒三錢 枳實一錢 乾生姜錢 茯苓五錢
白术焙五錢 甘草炙五錢 片姜黃一錢 陳皮七錢 澤鴻一錢
半夏洗一兩 半錢 猪苓五錢 砂仁三錢 厚朴錢製五錢

右爲末蒸餅丸如梧桐子大每服一百丸溫白湯送下

瓜萎實丸濟生方治胸痞痛徹背脇喘急妨悶

瓜萎實研

枳殼去穰半夏

湯洗七次

桔梗各一

火動加

右爲末姜汁打糊爲丸如梧桐子大每服五十丸食後淡

姜湯

○廣按此方瓜萎仁潤肺降痰枳殼破滯氣半夏豁痰燥
濕桔梗開膈載藥可謂善治痞悶喘急矣然痰因火動加
黃連尤妙丹溪云胸中痞須用枳實炒黃蓮是也

瀉 二十一

丹溪心法

○泄瀉有濕火氣虛痰積食積濕用四苓散加

蒼朮甚者蒼白一兩同加炒用燥濕并滲泄火用四苓散
加木通黃芩代火利小水痰積宜豁之用海粉青黛黃芩
神麴糊丸服之在上者用吐提在下陷者宜升提之用
升麻防風氣虛用人參白朮炒芍藥升麻食積二陳湯
加澤瀉蒼朮白朮山楂神麴川芎或吞保和丸瀉水多者
仍用五苓散久病大腸氣泄用熟地黃半兩炒白朮知母
各三錢升麻乾姜各二錢炙甘草一錢爲末粥丸服之仍用
艾炷如米粒於眞會穴灸三壯脾瀉當補脾氣健運復常
用炒白朮四兩炒神麴三兩炒芍藥三兩半冬月及春初用
肉蔻代之或散或湯作餅子丸佳食積作瀉宜再下之神
麴大黃作丸子服脾泄已久大腸不禁此脾已脫宜急瀉

之以赤石脂肉豆蔻乾姜之類

戴云凡瀉水腹不痛者是濕歟食入胃不住或完谷不化者是氣虛腹痛瀉水腸鳴痛一陣瀉一陣是火或瀉時或不瀉時或多或少是瘀積腹痛甚而瀉瀉後痛減者是食積

又方

一老人奉養太過歛飮傷脾常常泄瀉亦是脾泄

黃芩炒半兩白朮炒二兩白芍酒拌炒半兩泡各神麵炒半兩

山楂炒兩半

右爲末青荷葉包飯燒熟研丸如梧子大食前白湯下

治膈瀉

炒白朮三兩炒芍藥二兩炒陳皮一兩防風一兩

久瀉加升麻六錢

右剉分八貼水煎或丸服

止瀉方薑麵丸

隔年陳麥麵作麵二兩炒一兩茴香五錢生姜二兩又云一兩

右爲末或丸每服五七錢白湯下

又方

肉豆蔻五兩滑石夏二兩半秋二兩春冬一兩二錢半

右爲末飯丸或水調服

青六丸去三焦濕熱泄瀉多與清化丸他丸同行并不單用兼治產後腹痛并自利者以補脾補血藥送之

亦治血痢甚効

六一散一料紅麴炒半兩

右爲末陳倉米，礪丸，桔子大每五七十丸白湯下。又加五靈脂一兩，名靈脂丸能行血。

又方 治泄瀉或吐嘔

右以六一散生姜升湯調服

五苓散

六一散俱見溫熱

附脉理

脈訣舉要曰夏月泄瀉脉應暑濕，決而數洩，脉必虛極，治暑濕瀉分利小便虛脫固脾角，取不瘥。

附諸方

六和湯 治脾胃不調氣不升降，嘔吐或致泄瀉寒熱交作，小便赤澁。

加味五苓散 治伏暑發熱及胃暑泄瀉或煩渴，小便不利。
並見中暑

胃苓湯 治感暑夾食瀉瀉煩渴，即平胃散五苓散相合。

蒼朮 陳皮 厚朴姜製甘草 白朮

茯苓 猪苓 澤瀉 桂

右剉水煎入鹽少許如作末藥湯服亦可

來復丹

治伏暑泄瀉

見中暑

軟紅丸聖惠方治大人小兒發熱不調，吐逆不定，霍亂煩躁

吐瀉不止其効如神

明信

朱砂

研各半兩
乾胭脂二錢

巴豆七箇
去油

右研勻溶蠟二錢入油七點旋丸大人菉豆大小兒麻子大每服一丸濃煎槐花甘草湯冷下食前一服定

○已上數方治傷暑泄瀉之劑

藿香正氣散 治感濕泄瀉

參見胃寒

戊己丸 治脾胃不足濕熱泄瀉不正米穀不化宜升陽除

白术芍藥湯 治太陰脾經受濕水泄注下體重腹滿因弱無力不欲飲食暴洩無數水穀不化俱見痢類

升陽除濕湯 拔萃方 治脾胃虛弱不思飲食腸鳴腹痛泄瀉無度小便黃色四肢困弱

升麻

柴胡 防風 神麴 澤瀉

猪苓各半兩 蒼朮一兩 陳皮 芎草炙 大麥芽麵各三錢 右作十服水煎飯後熱服脾胃寒腸鳴加益智仁半夏各半兩姜棗煎非腸鳴不用

○已上數方治感濕脾濕泄瀉之劑

升麻湯 拔粹方治 一日大便三四次溏而不多者有時瀉腹中鳴小便黃

黃芩三錢 甘草二錢 升麻六分 柴胡三分 橘皮三分

益智

當歸身各三 分

紅花少許

右㕮咀分作二服每服水二盞煎至一盞去滓食前溫服

錢氏白术散 治脾胃氣虛或吐或瀉

參見痢類

參苓白术散 治脾胃氣虛飲食不進或致吐瀉

和平散 和脾胃止泄瀉並見調補脾胃

益胃湯 振粹方治頭悶勞動則微痛不喜飲食四肢怠惰燥熱短氣口不知味腸鳴大便微溏黃色身體昏悶口乾不

喜飲茶

黃芩

甘草

半夏各一黃芩

柴胡

人參

白朮

益智各三

當歸稍

升麻各半

陳皮

半升蒼朮一錢

右作

一服水盞半煎八分食前通肚服

○已上數方治脾胃氣虛泄瀉不止 見中寒

理中湯 治臟腑停寒泄瀉之劑

八味湯 治內寒泄瀉惡食

吳茱萸

去梗湯炮七次

乾姜

炮各二兩

陳皮

洗焙各

水香

肉桂

丁香

人參

當歸

洗焙各一兩

右剉每肆錢水一盞煎七分溫服

大藿香散 百一選方治一切脾胃虛寒嘔吐霍亂心腹撮痛

如泄瀉不已最能取効

藿香葉

洗去土二兩

陳皮

去白

厚朴

姜汁炒

青皮

去白微炒

木香

人參去芦

肉豆蔻

麵煨

良姜

炒

大麥蘖

炒神曲

詞子

煨去核

白茯苓

去皮微炒

甘草

炒各一兩

白乾姜

炮半

右爲末每服四錢吐逆泄瀉不下食或嘔酸苦水用水一

大盞煨生姜半塊鹽丁搗煎服

水泄滑泄腸氣臟毒陳

米飲入盃熱調下。赤白痢甘草黑豆湯下。脾胃虛冷宿滯酒食癰風作量大鹽少許嚼姜棗湯熱服。胃氣欬逆生姜自然汁一呷入鹽點服此藥大能消食順氣利膈。

開胃

養胃湯 治脾胃虛寒嘔惡心腹脹脹痛腸鳴泄瀉。見脾腎

調中散

治虛寒停食嘔吐腸鳴泄瀉。

藿香葉

砂仁

蓬木

乾姜

肉桂

去粗皮

茴香

草菓

麥芽

益智仁

橘紅

各一分

蒼朮

神麣

桔梗

甘草

錢半分三分

右用水二盞生姜三片棗一箇煎至一盞去滓入鹽少許溫服。

海藏神應丸 治因一切冷物冷水及童乳酪水所傷腹痛腸鳴泄瀉米穀不化。見宿食門

○已上數方治脾胃虛寒食積泄瀉之劑

香連丸 治熱渴糞色赤黃肛門焦痛糞出穀道猶如湯洩

煩渴小便不利宜五苓散吞此丸。見痢類

酒蒸黃連丸 治傷於酒每晨起必瀉宜生姜理中湯加乾

葛吞此丸

黃連

半斤淨酒二升浸以瓦器置瓶土蒸至爛取出晒乾

右爲末滴水丸梧子大每五十丸食前白湯下

神聖香姜散

仁存力一兩姜黃散浸片時水

宜黃連

四兩剉水浸片時

生姜

四兩切

右同丁慶淹丁宿銀石器內同炒姜赤黃色爲度去姜不用將黃連爲末每服三錢茶清調下

○已上數方治脾胃實熱酒積泄瀉之劑

五味子散 有每日五更初洞瀉服止瀉藥並無效此名脾腎泄宜服此藥或四苓散送下二神丸或椒附丸

五味子二兩吳茱萸半兩細粒綠色者

右二味炒香熟爲細末每服二錢陳米飲下

○廣按腎司閉藏今縱欲致虛而腎失職故有此病也

四苓散五苓散去桂是方見溫熱

二神丸

破故紙炒四兩 肉豆蔻二兩生

右爲末以大肥棗四十九箇生姜四兩切同煮棗爛去姜取棗肉研膏入藥和丸梧子大每五十丸鹽湯下

椒附丸 潤瀉久重其人虛甚

椒紅炒桑螵蛸炙龍骨

山茱萸肉

附子炒鹿茸酒蒸焙

右爲末酒糊丸每六十丸空心米飲下

當歸厚朴湯 治肝經受寒面色青慘厥而泄利

當歸炒厚朴製各二兩官桂三兩良姜五兩

石剉每三錢水煎食前服

○廣按經曰腎司閉藏肝司疏泄肝腎氣虛爲病泄瀉何也蓋腎者所處在下大小二使之門戶而肝者又爲門

戶約束之，具肝腎氣實，則能閉能束，故不泄瀉。肝腎氣虛，則閉束失職，故泄瀉也。又肝者脾之賊，肝經正虛邪盛，未能魁土，亦作泄瀉。此當歸厚朴湯，所以實肝而止瀉也。

香茸丸 治日久冷瀉

鹿茸五錢酒浸炙 乳香三錢 肉豆蔻一兩每箇作兩片，入乳香在內，麵煨

右爲細末，陳米飯丸，每服五十丸，空心米飲下。

一方 治泄瀉不止

用肉豆蔻一箇，剝殼，入乳香少許，麵裹煨熟，去麵研爲末。作一服，空心陳米飲調下。或單用豆蔻，紙裹煨去油爲末，和麵作滑拙服。金方

金鑰正元丹 治腎虛瀉瀉，小便頻數，盜汗遺精，一切虛冷之證並治之。見養遺類

○已上數方，治脾腎肝虛瀉瀉之劑。

實腸散 直指方 治泄瀉不止

肉豆蔻 詞子炮 宿砂 陳皮 蒼朮炒

茯苓各一兩 木香半兩 甘草四錢 川厚朴製一兩半

右㕮咀，每服三錢，姜棗煎服。手足冷者加乾姜。

止瀉方

人參去芦白木 乾姜炮 甘草炙 茯苓去皮

木香 薑香去土 詞子去核肉豆蔻麵裹煨，各等分

右㕮咀，每服一兩水二盞煎至一盞，去滓，通口服。

補脾丸百一選方治滑泄不禁

白朮

赤石脂

肉豆蔻

麵裹

煨草揆半兩

川厚朴

姜製

川白姜

炮各一兩

神曲

炒

麥蘖

炒

附子

炮去皮臍各半兩

右爲末

醋糊丸

如梧桐子每服五十丸空心米飲下

四桂散

治元臟氣虛

真陽耗散

腹臍冷痛泄瀉不止

白茯苓

去皮附子炮去皮臍人參

木香

濕紙裹火煨

右等分咬咀

每服四錢水

一盞姜五片鹽少許煎七分空

心溫服

麵鷄丸

治臟腑受風濕泄瀉不止

見痢類

肉豆蔻丸

和剎方治脾胃虛弱

腹脹脹

眼滿水穀不消

臟腑滑

泄

蒼朮

朱泔水浸切八兩

乾姜

炮各一兩

肉豆蔻

麵裹煨

厚朴

去皮姜製

甘草

炙各二兩

陳皮

去白各四兩

茴香

炒

川烏

炮去皮臍

荳子皮

各二兩

肉桂

去皮二兩

右爲末

每服二錢水

一盞姜三片棗一枚煎

分溫服

厚腸丸

百一選方治泄瀉不止

白龍骨

乾姜

炮各一兩

附子

炮去皮臍各一兩

厚朴

姜製

荳子核

炮去皮一兩

右爲末酒

糊丸

如梧子大

每服五十丸米飲下

豆附丸

和剎方治腸胃虛弱內受風冷

水穀不化

泄瀉注下

肉豆蔻

麪煨四兩

木香

不見火二兩

白茯苓

去皮四兩

白茯苓

去皮四兩

乾姜

炮

肉桂

兩

附子

炮去皮

丁香

不見火

一兩

右爲末，姜汁糊丸，如梧子大，每服五十丸，米飲下。
訶梨勒丸，治生方，治大腸虛冷，泄瀉不止，脇腹引痛，數食不化。

訶梨勒

炮

附子

炮

肉豆蔻

炮

吳茱萸

炒去梗

龍骨

生用

草撥

白茯苓

去皮

木香

不見火

各半兩

禹餘糧丸，治生方，治腸胃虛寒，滑泄不禁。
禹餘糧石，赤石脂，龍腦，草撥。

訶子

麪裹煨

乾姜

炮

肉豆蔻

麪煨

附子

炮去皮

附子

各等分

右爲細末，醋糊丸，如梧桐子大，每服七十丸，空心米飲。

下。

○廣按已上諸方，皆是止瀉之劑。蓋因人泄，腸胃虛脫，不得已而用之。若失新泄瀉，不可使用。止泄邪得補，而愈盛。惟當以分利小便導去濕氣爲上。又論治泄瀉，用藥不可太苦，太甘，太益，太苦則傷脾，太甘則生濕，惟當以淡劑利竅，爲最。

○已上數方，治腸胃虛脫，滑泄不禁之劑。

○廣按泄瀉之証，雖分濕火、寒、虛、痰食六者，之殊，必以滲濕燥脾爲主，而隨証加藥焉。濕則導之，火則清之，寒則溫之，虛則補之，痰則豁之，食則消之，是其治也。雖然，六証既明，而三虛不可不察。三虛者，何？脾虛，腎虛，肝虛也。脾虛者，飲食所傷也；腎虛者，色慘所傷也；肝虛者，忿怒所傷也。飲食

傷脾不能運化，色慾傷腎，不能閉藏。忿怒傷肝，木邪冠主，皆令泄瀉。然腎泄肝泄間忽有之而脾泄恒多爾。蓋人終日飲食，或有傷脾胃便致泄瀉也。必矣。又嘗論之：泄瀉痢瘧同乎一源，多由暑月脾胃氣虛，飲食傷積所致。飲食纔傷便作，則爲泄瀉。爲輕飲食停積既久，則爲瘧痢。爲重而瘧與痢又有分別。飲食爲瘧，充乎胸膈，則爲瘧疾。飲食爲積，膠乎腸胃，則爲痢疾。古人有言曰：無痰不是瘧，無積不是痢。良有以也。今之醫者不能究病之源，而徒執古人之方，以徧試之，欲其病愈也，胡可得哉。

泄瀉治例

出明醫雜著

王節齋曰：泄本屬溫，然多因飲食不節致傷脾胃而作瀉。

看時令分寒熱新久，而施治。治法補脾，消食，燥濕利小便，亦有升提下陷之氣，用風藥以勝濕。亦有久泄，腸胃虛滑，不禁者，宜收瀉之。

主方

白朮二錢

白朮芩

白芍藥炒各一錢半

已上三味，泄

陳皮一錢

炙甘草

去皮五分

瀉必用之藥

若傷食泄黃，或食積加神曲、大麥芽、山楂子各一錢，炒黃連，

七分消之

腹中窄狹飽悶，再加厚朴枳實木香各五分。

若小便赤澁，短少，加澤瀉、猪苓、木通各一錢，以分利之。

夏月

再茵陳分炒山梔子四

若口渴引飲，加乾葛一錢。

半


人參麥門冬各一升

麻滑石各四分

半

各四分

各四分



烏梅肉二箇

若夏秋之間濕熱大行，暴注水泄，加炒黃連、蒼木澤、鴈鈍各一升，麻木通各五錢，發熱燥渴，加乾葛石膏各一錢，黃疸小便。

黃赤加茵陳一錢、山梔木通各五錢。

若飲酒便泄，此酒積熱滯也，加炒黃連、茵陳、乾葛各一錢，木香五分、神麴、麥芽各一分。


若寒月溏瀉，清冷腹痛或傷生冷飲食，加神麴、麥芽、炙乾姜各一錢、宿砂益智木香各七分。

若久泄胃氣下陷，服利小便之藥而不效，宜加入參黃耆各一錢，以補中氣，升麻柴胡各四錢，以升提之，再加羌活防風、藁本、白芷等風藥各三分，助風以平之，更加炙乾姜各五錢。

以固之

若久泄脾胃虛弱，食少難化，加炙黃耆、人參各一錢，神麴、麥芽各一錢，木香、煨過乾姜各五分。

若久瀉腸胃虛滑不禁，加肉豆蔻一錢，诃子皮、赤石脂各一錢，煨木香、炙乾姜各五分。



丹溪心法附錄卷之七 終

丹溪心法附錄卷之七

七

