

6 5 4 3 2 1 30 9 8 7 6 5 4 3 2 1 20 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 1m 2 1 0

丹溪心法附錄卷之二十三

痘瘡一百

丹溪心法

○痘瘡分氣虛血虛用補 氣虛者人參白朮加鮮毒藥血虛者四物湯中加鮮毒藥酒炒黃芩黃連名鮮毒藥凡痘疹初出之時色白者便用大補氣血人參白朮黃耆川芎升麻乾葛甘草木香丁香酒洗當歸白芍藥若太便濕加荳子肉豆蔻但見紅點便忌葛根湯恐發得表虛也

吐瀉食少爲裏虛不吐瀉能食爲裏实而補則結癧

毒，脂伏倒壓爲表虛，灰白者亦表虛或用燒人屎。紅活綻凸爲表實，表實而更復用熟表之藥則要瀆燒不結痂。

痂。

吐瀉陷伏二者俱見爲表裏俱虛。

黑陷甚者亦用燒人屎蜜水調服出子和方。

痘瘡初出時或未見時有患者宜瀝服此藥多者令少重者令輕方以絲瓜近蒂三寸連皮子燒灰存性爲末沙糖拌乾喫入殊砂末尤妙。

痘瘡分人清潤就形氣上取勇怯。

黑陷一種因氣虛而毒氣不能盡出者酒炒黃耆酒紫草人

參

顏色正者如上治將欲成就却色淡者宜加益藥用當歸川芎酒洗芍藥之類或加紅花。

將成就之際却紫色者屬熱用涼藥解其毒，莽麻葛根黃連

黃芩桂枝連翹之類甚者犀角大鮮痘毒。

爐灰白色靜者怯者作寒看。

勇者燥者熾發者作熱看。

痘瘡鼠粘子連翹山楂甘草此四味始終必用之藥

全白色將壓時如豆殼者蓋因初起時欬水多其醫不齊俗

呼倒壓不好但服食表之劑消息他大小便如大使秘通

大便小便秘通小便。

有初起煩燥謔語在渴引飲若飲水則後來壓不齊急以涼

和濟心法卷三十三

三

藥解其標如益元散之類亦可服

癰瘍者於形色脉上亦虛實實則脉有力氣壯虛則脈無力氣快輕者用淡蜜水調滑石末以瓦潤瘍上

虛瘍者以吳茱萸之劑加涼血藥

實癰如大使不通者以大黃寒涼之藥少許與之下其結糞疎則無毒蜜則有毒宜涼藥解之雖數十點亦不妨無害眼

之患

瘡乾者宜退火溫者用溫濕退火只用輕劑芥荆升麻葛根之類渴濕乃肌表間濕宜用風藥白芷防風之類

如痘瘡傷眼必用山梔决明赤芍藥當歸尾黃連防風連翹升麻桔梗作小劑末調服如眼無光過百日後血氣復自

明

痘癰多是實毒血熱成癰分上下用藥丁口不可緩已成膿必用涼藥為主赤芍甘草節連翹桔梗上引^{升麻葛根}下引^{桔梗牛膝}助以貝母忍冬草白芷瓜萎之類太使燥用大黃奚寒熱用黃柏黃芩

痘瘡黑屬血熱涼血為主白屬氣虛補氣為主中黑陷而外白起得進者則相兼而治

初起時自汗不妨蓋蒸熱薰蒸而然故也

痘風分氣血虛實以日守之多覺氣血不足虛則黃耆生血活血之劑助之畧佐以風藥實則白芍為君黃芩亦為君佐^金以首芷連翹續斷之類

若屬寒陳氏方亦可用

入方解痘瘡毒

絲瓜

升麻

酒芍藥

生甘草

墨豆

山楂

赤小豆

犀角等分

右咬鳴每服三錢水一盞煎六分溫服

又方 治痘瘡已出未出皆可服

硃砂

右為細末蜜水調服多者可減少者可無

痘瘡敷藥

貝母

南星

殭蚕

天花粉

白芷

寒水石最多

草烏

大黃

豬牙皂角

右為末醋調傅之

附諸方

○補虛

黃耆紫草人參湯 治痘瘡表虛黑陷

即前丹溪方

黃耆

酒炒

紫草

酒炒

人參各等分

右為粗末每服五錢水一大盞煎六分加酒服

小異功散 治痘瘡裏虛吐瀉

及和胃助氣楊氏方

人參

茯苓

白朮

甘草

右為末每服五錢水一大盞姜蜜同煎六分服

白朮散

治裏虛吐瀉煩渴除身熱清神生津痘瘡無顏色者

陳皮

木香各等分

子午余卷三

四

尾可服

人參

白朮

茯苓

甘草

木香

藿香各七
分
乾薑一錢四分

一方作乾姜止泄瀉用

右為粹末水一大盞姜棗同煎至六分溫服

大補湯

實表裏補氣血

治痘瘡陷伏不紅者

當歸

川芎

白芍藥

生地黃

人參

白朮

甘草

白茯苓

黃耆

官桂各等

右㕮咀大小兒每服五錢小小兒三錢水煎服

痘瘡治例

心法附錄曰小兒凡覺身熱証似瘍寒若未經瘡痘疑似未

明其先與惺惺散參蘇散或人參羌活散

熟甚者則與升麻葛根湯人參敗毒散

痘瘡已可則少與化毒湯

出不快者加味四聖散紫草飲子紫草木香湯紫草木通湯

或快斑散

出太甚者人參敗毒散犀角地黃湯

小便赤澀者大連翹湯甘露飲麥門冬五苓散

大便秘結內煩外熱者小柴胡湯加枳殼最當或少與四順

清茶飲

若咽喉痛者大如聖湯鼠矢子湯

喘滿氣壅者麻黃黃芩湯

胷脹脹滿者枳殼桔梗湯二陳加枳殼湯

胷脹脹滿者枳殼桔梗湯二陳加枳殼湯

煩渴者，甘草散烏梅湯。

若下痢嘔逆者，木香理中湯，甘草乾姜湯。
若陷入者，加味四聖散，更以胡荽酒，薄傅其身，厚傅其足，墳其衣服，併以厚綿，蓋之。若猶未也，獨聖散入射，香老酒調利，或不用酒，則木香煎湯，若其瘡已黑，方可用。錢氏宣風散加青皮，主之。

然而瘡疹用藥，固有權度大小，一便不可不通。其有大便自利，所下黃黑，則毒氣已減，不必多與湯劑，但少用化毒湯可也。或不用亦可。若太小，一便一或閉，則腸胃壅塞，脉絡凝滯，毒氣無從而發泄，眼閉，聲啞，肌肉黧然，不旋踵而告變矣。

○發熱

瘧暉散 治小兒風熱及傷寒時氣，瘡疹發熱。

白茯苓 細辛 桔梗 瓜蔞根 人參

芍草 炙 白朮 川芎各等分

右為末，每二錢水煎，入薄荷三葉同煎服。

參蘇散 治小兒時氣傷風，傷寒發熱，惡寒咳嗽，未明痘瘡，是與不是疑似之間，此藥甚為穩當。

楊氏謂解散即此方。

前胡 人參 紫蘇葉 乾葛 午夜 湯泡七次
姜汁製
茯苓 各三分 枳殼 陳皮 芍草 桔梗 各二分
右㕮咀，姜棗煎，微熱服。

人參羗活散

羗活

獨活

柴胡

人參

川芎

枳殼

茯苓各三分

前胡

北梗

天麻

地骨皮

甘草

炙各一分半

加麻黃薄荷葱白煎服。汗後尚熱，宜服此去麻黃，加紫草。如已見三五點，加紫草陳皮赤芍使熟退瘡出，亦輕更調辰砂末半錢以制胎毒。

消毒救苦散拔萃方治瘡瘍，悉具消化便令不出。如已出稀者，再不生斑。

麻黃

羗活

防風錢五

川芎

藁本

葛根

蒼朮

酒黃芩

生黃芩

柴胡錢二

細辛

橘皮

紅花

蘇木

生地黃

酒黃柏

連翹各五

黃連三分，生甘草一分，吳茱萸半分

右剉如麻豆大，每服五錢水一盞煎，去渣熟服。

三豆子湯 治天行豆瘡，但覺有此證即服之。

赤小豆

黑豆

荅豆各一

甘草節五錢

右淘淨水煮熟，任意食豆歟。十七月自不癥。

惡實膏

用惡實子為末，蜜調貼額門上，免有患眼之疾。

熟甚者

升麻葛根湯 加山楂大力子，其瘡稀疎而易愈。

川升麻 甘草 白芍藥 磁各一錢 葛根半錢

右㕮咀作一服水一盞半煎八分溫服

人參敗毒散

方見前

涼膈散 治小兒瘡疹未出三焦積熱煩燥多渴及面赤面
熱頭昏咽喉腫痛口瘡便溺赤虛狂言譁妄騎卧不
安並宜服之

大黃 朴硝 甘草 植子仁 黃芩

薄荷葉 各一兩

連翹 四兩

右爲末每服二錢竹葉五片蜜燉小水一盞煎八分溫服
若瘡疹已出發熱作滑脈實悶亂便實者亦宜服此便不
實者切不可服恐內虛而毒氣不能發外也

謹按瘡已發有寒熱溫涼不同形氣盛虛之異虛者
用異功散實熱者用涼膈散有起死迴生之效若以實熱
為虛寒用異功散虛寒為實熱用涼膈散死生在反掌之
間慎之慎之

○已出

化毒湯 治瘡痘已發以此消毒

紫草茸 半兩 升麻 甘草 磁各二錢半

右剉散每服二錢粳米五十粒同煎服

○出不快者

四聖散 簡易方 治小兒瘡疹出不快透及倒廢下一切惡候

紫草茸 木通 大節 甘草 枳殼 去白炒 各等分

右咬頭每服二錢水一盞煎服

加味四聖散

紫草 木通 黃耆 川芎

木香 甘草 炙少許半

右為粗末水煎服 大便閉加枳殼 大便祕常加糯米百粒 楊氏曰糯米能解毒發瘡

紫草木香湯 治瘡出不快大便泄利

紫草 木香 茯苓 白朮 等分

甘草 炙少許

入糯米煎服 楊氏云紫草能利大便白朮本耆佐之

紫草木通湯

紫草 人參 木通 糯米 等分

甘草 炙半

右剉煎二錢溫服 内虛大便利者可入南木香去紫草

快斑散

紫草 蟬殼 人參 白芍 各二錢半

木通一錢 甘草 炙半錢

右剉散煎一錢溫服

又方

紫草甘五錢 陳皮二錢 黃耆三錢 赤芍五錢

甘草 炙三錢

右剉加糯米百粒煎三歲已上服三錢已下一錢服後瘡

偏身四肢住服

絲瓜湯

絲瓜連皮燒存性為末湯調 楊氏云發豆瘡最妙或加
甘草紫草

消毒散 和剎方治毒飲壅遏壯熱心煩瘡疹難出未能勻透

牛蒡子炒六兩 荆芥穗一兩 甘草炙二兩 防風

升麻各一兩半

○右㕮咀每服二錢水一盞煎服如太便利者不宜服

○出大甚者

人參敗毒散方見前

犀角地黃湯

犀角一兩 生芍二兩 赤芍七錢半 牡丹皮一兩

右㕮咀三歲兒三錢水煎

○稠密者

加味犀角消毒散

惡實四兩炒 甘草炙一兩 防風半兩 荆芥穗二兩

宜加山楂酒黃芩酒洗紫草減食加入參

右為末煎紫草糯米芫荽湯調服食後臨卧日三
黍粘子湯拔萃方治癰子已出稠密身表熟急與此藥以防
已後青乾黑陷

鼠粘子炒香 當歸身酒洗 甘草各一錢 柴胡
連翹 黃芩 黃芪各一錢 地骨皮 一錢

右為粗末，每服一錢水煎，去滓，溫服。空心藥進，且休與乳食。

○小便赤澁者，

大連翹湯

連翹

瞿麥 荆芥 木通 車前

當歸

防風 柴胡 赤芍 滑石

蟬蛻

甘草炙各一錢黃芩

山梔子

甘露飲子

生芍 熟芍 天門冬去心麥門冬去心

枇杷葉

毛枳殼麸炒去穰黃芩 石斛

山茵陳

甘草

右剉每二錢水一盞煎，入分食後服。

五苓散

加麥門冬煎服。方見中暑

○太便閉結內煩外熱者，

小柴胡湯

加枳殼同前服。方見溫熱類

四順清涼飲子

當歸

赤芍 大黃虛者，煨

甘草各等分

一方加陳皮梗米煎。

○咽喉痛者，

如聖飲子

瓶水心法門

卷一

桔梗

甘草

鼠粘子

炒各二錢

麥門冬三錢

右為末竹葉同煎二三錢

一方加荆芥防風重者竹瀝同煎

鼠粘子湯

鼠粘子

炒四錢

荆芥穗

二錢

甘草

一錢

防風

半錢

右為細末沸湯點服去防風名消毒散

○喘滿氣壅者

麻黃黃芩湯

麻黃三錢赤芍

黃芩

各二錢半

甘草

炙

桂枝

各半錢

○脣腹脹滿者

桔梗枳殼湯

枳殼

桔梗

各二兩

甘草

炙半兩

右剉姜煎

二陳加枳殼湯

半夏

橘紅

各二兩

甘草

炙半兩

右剉姜煎

○煩渴者

甘草湯

甘草

瓜蔞根等分

右為末每服一錢煎服

烏梅湯

小黑豆

菉豆各一合烏梅二箇

右咬咀新汲水一碗煎，取清汁旋服。

人參麥門冬散集驗方治發熱煩渴，

麥門冬

去心一兩

人參

甘草

炙

陳皮

白朮

厚朴

姜製各半兩

右咬咀每服二錢水一盞煎，六分去渣溫服，不拘時。

○下利嘔逆者

木香理中湯

本方中加木香甘草乾姜

方見中寒

○陷火者

五分

加味四聖散

方見前

胡荽酒

以芫荽煎酒薦傅其身，厚傅其衣服，以厚繩，
蓋之。

獨聖散

牛蒡子炒五錢

白殼蘇二錢半


右末入紫草三莖同煎，連煎二服。前條云獨聖散，入射
桑老酒調剉，如不用酒，則木香煎湯調服。

又方

穿山甲湯洗淨炒焦黃為末，每服半錢入射香少許，木香
煎湯調下。或紫草煎湯入紅酒少許調下。

○黑附者

宣風散



損柳二箇 陳皮 茵草各半

四兩半
兩半熟

黑丑生半熟

右為末每一錢量大小與蜜湯調下

無價散御藥院方治斑瘡不出黑陷於死者

人猪狗犬鷄晨燒

少許微將蜜水調

百者救生無一死

黃金萬錠也難澁

右將前四物於臘日早晨日未出時貯於銀鍋內用炭火，
煅令烟盡白色爲度，但是瘡發不快倒壓黑陷者及一切

惡瘡每用一字蜜湯調服其效如神

一說人糞用九歲以下無疾童子者猪狗犬糞用未被陽
雄者先於重丸日各置於爭處銅之以飯勿令雜食過旬
日換盡腸之宿垢方收其糞陰乾候臘八日未出時燒

百祥丸

紅芽大戟不以多少陰乾漿水煮熟去膏月中曝乾
復細元汁中煮汁盡焙爲末水丸如粟米大每服十二
丸研赤芝麻湯下


又湯氏方 治小兒豆疹黑陷者

羌活一兩 川山甲醋炒黑生人骨火煅存性各半兩即人牙

麝香少許

右四味為細末麻黃薄荷煎湯調一錢只用一服便瘥萬
不失一

乳香散 治痘瘡既收心痛不可忍者餘毒龜心急煎乳香
散服之



乳香半錢或一二錢

右用冰一盞煎服，一方加沒藥赤芍，藥當歸同煎。

○疔毒

四聖丹 治痘瘡中有長大紫色者，為疔毒，把住痘瘡不起，發急用簪尖挑破紙入此丹，

珍珠

三五粒
上燄微黃色研

礮豆

四十九粒
燒灰研

頭髮

燒灰有性

右為細末，用擦面油、臘脂調成膏子，將兒在溫燠處安存，忌風寒穢氣。先用簪尖平撲開疔口，將藥紙入疔內，即時變為紅白色，餘瘡皆起。又嘗見有疔且者，但挑破出其黑血，即愈。或挑開用口咂去黑血，或用綿裹指弾，消其黑

血，良矣。亦可蓋目，疔且破而毒氣得散也。

○愈後諸疾

五福化毒散 湯氏方治痘瘡，餘毒未解，井上焦熱壅，口齒出血。

玄參一兩

桔梗去蘆八錢

赤茯苓

人參

牙硝別研各半兩

青黛半錢

甘草一錢

麝香半錢別研

右為末，入青黛和匀，煉蜜為丸，如芡實大，金銀箔為衣，磨生犀水化下。齒血臭氣，用生地黃汁化下。


人參白朮散 錢氏方治痘已膿，身熱不退，此藥清神，生津除煩，止渴。

人參

白朮

藿香葉

木香



甘草 白茯苓各一
乾葛二两

右咬咀，每服三錢水一盞煎六分温服，不拘時。
雄黃散集驗方治小兒因痘瘡牙齦生瘻，咬觸瘻。

雄黃一兩 銅線二錢

右同研極細末，量瘻大小乾，捲其上。

綿蠶散陳氏方治因痘瘡身體肢節上有齊缺瘻膿水不絕，用此蠶綿，不拘多少以生自攀，搘碎置其內，炭火燒令攀汗盡，取細研，乾，捲瘻上。

穀精草散陳氏方治痘已壓眼，且翳膜或癰癧，多淚。

穀精草一兩 生蛤粉一兩

右爲末，積猪肝一葉以竹刀批作片子，捲繩在內，用苧繩。

縛定於磁瓦器內，貯水慢火煮熟，食之。

一方 治癰瘡入眼。張子和方

炒熟蘇子、耳草、卷舌防風等分，搗

每服一錢，將水下。

搗，噙，見白，直到光

又方 張子和方

硃砂 腸子 水銀

麝香各等


右四味研爲細末，用冰銀調滴耳中。

一方 治小兒出痘疹，眼內有翳翳。瑞竹堂方

輕粉

黃丹各等分

右爲末，竹筒吹入耳內，左眼有翳吹右耳，右眼有翳吹左



耳即退

麥湯散 治永豆

陳氏方

地骨皮半分

麻黃一分去節甘草絲半人參一分

滑石半分

大黃一分濕

紙裹煨

知母各一分

甜葶藶一分用隔炒

羌活一分

右爲末每服半錢水一盞小麥七粒同煎半數沸服

○陳氏痘疹證治

凡小兒瘡疹未出已出之間有類傷寒之狀其瘡疹癰腫脣
然憎寒壯熱身體疼痛太使黃稠此乃是正病也若無他
疾不宜服藥

凡瘡瘍瘖先分表裏虛實若虛實不分則無所治如瘡瘍俱實者

一捻金散 治小兒鵝口口瘡

雄黃三錢 鵬砂一錢 龍腦少許 甘草半錢

右爲末乾擦患處或用蜜調搽

一方 小兒白屑滿舌狀如鵝口

葛氏方

用髮纏指頭蘸井花水拭口上如不脫濃者粟米汁以綿
繩筋頭拭之劫用煅過黃丹擦之

一方 小兒初生舌下有膜如石榴子連於舌根令兒言語不
發可摘斷之微有血無害如不止燒髮灰擦之

葛氏方

鴻心湯

陳氏方治小兒口瘡

用黃連去芦爲末蜜水調服洗心散丸妙 方見火類

硃礬散和別方治口瘡鵝口不能乳者

用硃砂細研白礬等分爲末使亂髮纏指揩拭舌上令

以藥傅之

一方 治小兒口瘡

桔梗白礬一兩 黃丹一錢半 乳礬半錢

右件煉蜜爲丸如皂子大臨卧噙化小兒用筋頭點

一方 治小兒心有客熱滿口生瘡 楊氏方

用天南星末醋調貼脚心又有用吳茱萸末米醋調

塗亦可

又方

用巴豆一粒去殼搗爛黃丹少許和捏外用紙護貼看

致冷藏腑受冷榮衛滯滯則血氣不能衝貫皮膚肌肉其瘡不得起發不得充滿不得結實不能成痂故多痒煩燥渴渴而死皆因宣利解散之過也縱得其生而必卒矣若瀉水穀或瀉白色或瀉淡黃色者煎十一味木香散送下七味肉豆蔻丸治之如瀉止佳服不止者多服

若瀉頻多津液內耗血氣不榮其瘡雖是起發亦不能醫也知身溫腹脹咬牙喘渴者難治綠水穀去多津液枯竭而欲飲水不止者蕩散真氣故多死矣速與十一味木香散救之

若四五日不大便者可用肥嫩豬腰一塊以淡白水浸火煮軟熟取出切如豆大或皂子大與小兒食之令臟腑滋潤

使瘡痂易落百無滯碍切不可妄投宣藥恐內虛瘡毒入於裏傷兒真氣

若六七月身壯熱不大便其脉繫盛與三味消毒散微得利即住

若小兒神氣軟弱瘡疹自初出兩日至十二日當忌外人恐有卒暴風寒穢惡之氣觸兒瘡疹

若身反發熱煩渴者宜服六味人參麥門冬散治之如不愈者只服七味人參白朮散

若瘡瘍欲癰已癰之間或不能壓腹脹煩渴者不可與水蜜

若飲者轉渴而死急煎十一味木香散救之


若瘡瘍欲癰已癰之間頭溫足指冷或腹脹渴氣促者不

可與水蜜若飲者即死急煎十二味異攻散救之

若十日至十一日當壓不壓其身不壯熱悶亂不寧卧則硬氣煩渴咬牙急煎十二味異攻散更加木香當歸以救陰陽表裏若與水蜜西瓜等冷物食之即死

若十一日十二日瘡痂已落其瘡癰猶黯或凹或凸肌肉尚嫩不可澡浴亦不宜食炙燭物又不宜食五辛五味并有毒之物恐熱毒薰于肝膈眼目多生翳障若不依此禁忌必為小兒終身之患用兩味穀精草散治之

若豆瘡已臍其痂欲落不落煩渴不止切不可與水蜜西瓜紅柿等冷物食之若食之轉生焦渴或頭溫足冷或腹脹或時渴或咬牙以致難愈速與十一味木香散救之即瘥



若身壯熱經月不除別無他證以六味柴胡麥門冬散治之
熱退住服如不愈別無他證以六味柴胡麥門冬散治之

若身壯熱太便堅實或口舌生瘡咽喉腫痛皆是瘡氣餘毒
未盡以四味射干鼠粘子湯治之如不愈者以七味人參

白朮散主之

若風熱咳嗽咽喉不利三昧桔梗甘草防風湯治之如不愈
者以七味人參白朮散主之

若瀉嘴稠粘身熱鼻乾大便如常小便黃赤以十六味人參
清膈散治之如不愈別無他證以七味人參白朮散立效

若寒實壯熱胸中煩悶大便堅實卧則喘急以五味前胡枳
殼湯治之

凡痘瘡首尾不宜與水喫少與冷熱湯則可若悞與之瘡膿
之後其肺運落或身生癰腫若鍼之成痈敗瘡血水不絕
甚則面黃唇白以致難愈者何也蓋脾胃屬土外主身之
肌肉祇緣飲水過多濕損脾胃搏於肌肉其脾曾肌肉虛
則津液衰少津液衰少則榮衛滯滯榮衛滯滯氣血不能
周流凝結不散故瘡肺運落而生癰腫也

若微作渴者以七味人參麥門冬散治之如不愈者只服七
味人參白朮散治之

若身熱大渴以七味人參白朮散治之如不愈者只服七
味木香散治之

若腹脹滿者或瀉者或足指冷渴者或驚悸渴者或身溫

渴者或身熱而能白色渴者或寒戰渴不止者或氣急咬牙渴者或飲水轉渴不止者以上九證即非熱也乃脾胃

肌肉津液衰少故也宜服一味木香散治之如不愈者更加丁香官桂多煎服丁香攻裏官桂發表其表裏俱

實而瘡不致於痒瘍喘渴死矣

若瘡疹已曆未愈之間五臟未實肌肉常虛血氣未得平復忽被風邪搏於膚腠之間則津液澁滯故成瘡痏瘍也宜用雄黃散綿繭散等藥治之久而不愈者潰骨傷筋以致殺人

凡斑駁疹毒之病俗呼疹子是肺胃有熱也其肺胃蘊積熱毒或以時氣所作薰發於皮膚狀如蚊蚤所咬故赤癩通

根麥門冬散生地黃散主之

○廣按丹溪瘡疹豆瘡各立病目所治不同而陳氏瘡疹混同立論豈不悞哉夫豆瘡出於脾其間有熱燥者有寒熱者而瘡疹出於心肺心肺屬陽多是風熱兼痰而作宜於通聖散中消息之陳氏此篇却言斑疹乃是肺胃蘊積熱毒每因時氣所觸而作用葛根麥門冬散生地黃散治之方合病情可見瘡疹不可一途而治也明矣

凡痘瘡或悞抓成瘡膿血淋漓氣衰肌肉虛故也切不可用新牛糞燒灰敷之其臭穢反觸其瘡宜用敗草散治

之仍服十一味木香散加丁香肉桂煎服

黃帝問曰飲食陰陽何也好飲冷者冰雪不知寒好飲熱者沸湯不知熱岐伯對曰陽盛陰虛飲冷不知寒陰盛陽虛飲湯不知熱治之何如故陽盛則補陽虛用木香散加丁香官桂治之陰盛則補陽虛用翼攻散加大香當歸每一兩藥共加一錢翼攻散能除風寒濕痺調和陰陽滋養氣血使豆瘡易出易醫不致痒癩木香散性溫平能和表裏通行津液清上實下扶陰助陽之藥也善治小兒腹脹渴渴其效如神不能盡述大抵天地萬物遇春而生發至夏而長成乃陽氣薰蒸故得生長者也今瘡疹之病臟腑調和則血氣充實自然易出易醫蓋因外常和緩內無冷氣

之所由也

凡痘疹五不治一痒癩塞戰不止者二紫黑色喘滑不寧者三灰白色陷頂脹脹喘渴者四頭溫足冷悶亂飲水者五咬牙氣促泄瀉煩渴者皆難治

若豆瘡已出七日之間其瘡不光澤不起癰根窠不紅痒癩抓搔謂之表虛也可驗證服藥蓋肺主身之肌肉肺主身之皮毛今痘瘡出是肌肉皮毛受其證也治法先當調和臟腑滋養血氣使脾不虛而肺不寒表裏冲和其瘡自然易出易醫故經云表病裏和不治而自愈也

今將痘疹輕重開其子后

輕者作三次出大小不二等頭面稀少

重者

渴渴

根窠紅

肥滿光澤

一齊并出，如蚕種

稠密

輕變重

犯房事

不思口

先曾渴

重變輕

避風寒

餌涼藥

常和緩

大便稠

胡荽酒

以芫荽煎酒，述房噴之，以避穢濁之氣。

胭脂膏

以乾胭脂用蜜調全兒兩眼，則痘瘡不入眼內。

升麻葛根湯

四味 方見前

木香散

十一味

木香

大腹皮

人參

去芦

桂心

青皮

去穢赤茯苓 去皮 前胡去芦 詞黎勒去核

半夏

姜製丁香

甘草各三錢

右咬咀，每服二錢水一盞，姜三片同煎，空心溫服，量兒大小加減，一方去桂心，丁香加桂枝藿香。

異攻散

十二味

木香

當歸

各三錢半

官桂去粗皮

茯苓去皮

白朮

各二人參

厚朴姜炒

肉豆蔻

丁香 陳皮各二錢半 半夏姜製 附子炮去皮各一錢半

右咬咀每服二錢水一盞姜五片肥棗三枚同煎空心溫服量大小加減一方去丁香附子加藿香乾姜

肉豆蔻丸七味

木香 縮砂仁各三錢 白龍骨 詞子肉

肉豆蔻各半兩 赤石脂

枯白礬各七錢半

右為細末麪糊丸如黍米大一歲服三十九三歲服百丸米飲湯下漏甚者煎異攻散吞下漏不止多服或漏水數白色淡黃色木香散送

消毒散 出後身壯熱不太便其脉繫盛用此微利

牛蒡子炒四兩

荆芥穗

葛草炙各一兩

右咬咀每服二錢水一盞煎溫服量大小加減

人參麥門冬散六味 出後身反發熱煩渴者

方見前

人參白朮散七味 出後身壯熱大渴嘔吐泄瀉

方見前

柴胡麥門冬散六味 出後身壯熱經日不除

柴胡

甘草炙

人參去蘆黑參 各二錢半

龍膽草一錢半

麥門冬去心三錢

右咬咀每服二錢水一盞煎溫服量大小加減

射干鼠粘子湯四味 壯熱便竇口舌生瘡咽喉腫痛

鼠粘子

炒香四兩

甘草炙

升麻

射干各一兩

右每服二錢水一盞煎溫服量兒大小加減

桔梗芽草防風湯三味 治風熱咳嗽咽喉不利

桔梗

甘草

炙 防風 各等分

右每服二錢水一盞煎溫服量兒大小加減
人參清膈散十六味治涕唾稠粘身熱鼻乾

人參

柴胡

當歸

芍藥

知母

桑白皮

白朮

黃耆

紫菀

地骨皮

茯苓

甘草

桔梗

各一兩

黃芩 半兩 石膏

滑石 各一兩半

右每服二錢水一盞姜三片同煎溫服量大小加減
前胡枳殼湯五味疾實壯熱胸中煩悶大便堅實

前胡

一兩

枳殼

赤茯苓

大黃

甘草

灸各半兩

右咬咀每服二錢水一盞煎溫服量大小加減如身溫脉微并渴者不可服

雄黃散

因痘瘡牙齦生潰蝕瘡方見前

鴉蘭散

因痘瘡身體肢節上有潰蝕瘡膿水不絕者方見前

敗草散

用蓋房多年爛草或蓋牆爛草亦可其草經霜露

感天地陰陽之氣善解瘡毒其功不能盡述取草不以多少晒乾或焙乾為末乾貼瘡上若渾身瘡破膿水不絕粘貼衣裳難以坐卧可用一二升攤於席上令兒坐卧其效如神仍服木香散加丁香官桂同煎服

韶粉散

痘瘡纏愈而毒氣尚未全散瘡凹雖落其瘢猶黯

或

凸內起當用此藥塗之

韶粉一兩

輕粉一錢

右和研勻入煉過猪脂油調和如膏薄拭瘡上如痘瘡欲落不落當城瘢痕

落不落當城瘢痕

又方

用羊髓骨髓一兩入輕粉一錢研成白膏以蜜盒盛之塗瘡上如痘瘡痒甚俱搔成瘡及瘡痂欲落不落用上等白蜜塗之其痴落亦無紫黑瘢痕

穀精草散 治痘瘡入眼

蕎朮

槐花各一錢

藁本

蛇蛻

防風

枸杞

白蒺藜各三錢

黃芩

川芎各半兩

白菊花 木賊

甘草各二兩

蟬蛻四錢

乳香

沒藥各半錢

硬石膏

穀精草三錢

右為末每二錢白水煎食後服

菊花散 治痘瘡入眼

白菊花

三兩

菉豆殼

各一兩

蜜蒙花

旋覆花

穀精草

各一兩

右為末每服二錢用乾柿一枚粟米泔一盞煎乾為度取

乾柿食後服之

蟬菊散

豆蔻入目或病後生翳障

蟬兒去土淨洗

白菊花各等分

右為末，每服二錢水一盞入蜜少許，同煎乳食，後溫服量兒大小加減。

葛根麥門冬散 治小兒熱毒斑疹頭痛壯熱心神煩悶

葛根

麥門冬

去心各三錢

人參

去蘆半兩

石膏

半兩

川升麻

二錢

甘草

茯苓

各二錢

赤芍藥

一錢

右每服二錢水一盞煎溫服，量兒大小加減。

生地黃散

治斑駁疹毒身熱口乾咳嗽心煩

生地黃

半兩

麥門冬

去心各七錢

杏仁湯泡去皮

款冬花

陳皮

各三錢

甘草

三錢


右每服二錢水一盞煎服，量兒大小加減。

麥湯散

治水痘

方見前

廣按瘡疹之源，蓋由母妊娠之時，飲食過熟，炙煖過厚，味醇酒，兒在腹中浸漬，食母血穢，而成毒伏於五臟之間，及生之後，或因外感風寒，內傷虛冷，跌撲驚恐，時氣流行，觸動鬱火發於肌膚之間，心臟之毒為癰，肺之毒為疹，肝臟之毒為水泡，脾臟之毒為膿泡，小兒稟厚，毒少，氣血調匀，表裏充實，則易發易癥，苟或稟弱，毒盛，表裏虛，氣血弱，必須醫藥調治，庶幾有瘳。前輩明醫錢仲陽氏出，其病源是熱，是燥，故用辛涼之藥，以清熱潤燥，及陳文中氏出，又見病源之中有寒濕者，故用辛溫之劑，以溫寒，散濕，此二先生兩得之，後之宗錢氏者，惟知辛涼之是勢，而寒濕者不宣，宗陳氏者，惟以辛



溫之是從而熟燥者不可小兒罹此禍患可勝計哉苟能用二子之長而無二家之弊斯可也故丹溪朱先生曰豆瘡者氣益虛表裏虛用補又曰瘡乾者是火宜退灭瘡濕者是溫宜濕又曰爛灰白色靜者怯者作寒看勇者燥者熾發者作熱看先生之言可謂活潑溪地矣以此觀之小兒豆瘡表裏充實者固不必於藥而虛中有寒濕者與夫虛中有熱燥者必須於藥也今將附方補虛及痘瘡治例具之於前使小兒痘瘡屬熟燥者宗之又以陳氏痘疹證治附之於後使小兒痘瘡屬寒溫者宗之後之業是科者必以補虛爲主視其形色脉證寒溫熟燥及天時寒暄而分治之嬰孩之幸也又接辨也

王節齋論曰丹溪痘瘡治法最為明備近世通用陳文中木香異攻等方乃一偏之術若豆瘡陷伏淡白色及內鴟渴腹脹者此屬虛寒宜用陳文中方若身盛稠密紅紫色及大使燥結者此屬熱毒急宜涼血解毒自陳文中方盛行後屬虛寒者率得生屬熱毒者悉不救豆是胎毒古人治法只解毒然吐瀉裏虛則送毒氣不出及不能成就故陳文中之法亦千千載妙訣補前人之未補者但溫補之法既行而解毒之旨遂隱故救得一邊又害了一邊必須詳究丹溪陳文中二法通用斯無弊也

○痘瘡屬虛寒者直可延至十數日後方死屬毒盛轉

紫色者不過七八日，蓋痘是胎毒，自內出，一二百日方
出。毒氣尚在內出，至六日則當盡，發於表，七八九日
成膿，而結痂矣。若毒氣盛，不能盡出，過六日，毒反內入，
臟腑故須於八日以前，毒氣該出之時，急服涼血解毒
之藥，以驅出之。八日以後，醫蠱及矣，故其死最急。若虛
弱，毒氣少者，只是氣血不足，不能貫膿成就，故綿延日
久而後死，此虛實輕重之分也。

○痘瘡多者，是毒氣多，便先宜解毒，不然則恐氣血周
貫不足，故隨後亦宜兼補藥，以助成膿血。

