






定正方極序

夫醫之掌疾病者治之也方已是以其所學也又唯方已故於治疾之方非無一定之法也其得一定之法而治一毒萬變之疾病則豈其為難乎雖然其方古今不同以其不同人多惑焉古疾醫之道所以不興也蓋上古醫聖之作為方法乎壹是皆為治疾病也其治疾病則其所採擇草木蟲石皆知有其猛烈之毒而以方法攻擊於一毒萬變之疾病也於是古方必瞑眩其瞑眩疾即瘳矣故周禮曰聚毒藥以供醫事書曰若藥弗瞑眩厥疾弗瘳其攻疾以毒藥養精以穀肉菓菜古之教道也不依古之教道而眩今之論說宜哉口雖說

萬病心不解一毒遂不能治疾病而妄謂
攻擊不如補益噫嘻天下滔滔者皆是也
惟則古疾醫之道所以不興矣近世有
東洞翁之出也懷絕代不群之材而以疾
醫為任於是道再興矣 長圭翁剛毅俊
傑而繼其業 桐谷先生篤信好古而復
繼焉嗚呼濟民之道厚生之術顯我

日本亦唯天哉 東洞翁既作方極而行
于世猶未盡美於是乎 長圭翁校正之
桐谷先生監定之名曰定正方極實三代
之遺方而莫有出于斯右者矣可謂盡其
善而盡其美者也夫醫之掌疾病者治之
也方已故其所學也又唯方已若有後世
發憤欲奉古疾醫之道者而精思於斯書

則復為秦張之徒如眎諸掌也是予之所
以作序也

寬政二年庚戌仲春日

東都

大岳晁敬順卿甫撰



定正方極卷之上

大日本

阿岐

東洞吉益先生

著

東都

長圭瀨丘先生校正

小泉

桐谷岡田先生監定

桂枝湯

治拘攣上衝頭痛發熱惡風者

桂枝三兩

六分三厘七毛

芍藥三兩

同

生薑三兩

同

甘草二兩

四分二厘五毛

大棗十二枚

六分三厘七毛

右五味以水七升

一合四勺

煮取三升

六勺

是則八歸劑而五歸量也

通二錢三分三厘六毛重三錢九分七厘三毛

長圭翁曰以漢衡量計之得一貼重

二十八錢而以水七升煮取三升降

殺之以律今一貼則諸方劑熬盡有

不可得一滴汁者故據古衡量而隨

病之緩急作大小各貼可也如甘草一尺厚朴二尺亦謂大槩可以見也已雖然當於其大小貼中而一味之輕重以權衡審計之可也不可忽矣故據古衡量而今作分量考通重二字前後可換其所通即通計也重生薑已入之重也

桂枝加桂湯

治桂枝湯證而上衝劇者

於本方內更加桂枝二兩

四分二重五毛

桂枝加芍藥湯

治桂枝湯證而拘攣甚者

於本方內更加芍藥三兩

六分三重七毛

桂枝加葛根湯

治桂枝湯證而項背強急者

於本方內加葛根四兩八分五厘

桂枝加栝蒌根湯

治桂枝湯證而渴者

於本方內加栝蒌根二兩四分二厘五毫

桂枝加黃耆湯

治桂枝湯證而自汗盜汗者

於本方內加黃耆二兩四分二厘五毫

桂枝加芍藥大黃湯

治桂枝加芍藥湯證而實者

於桂枝加芍藥湯方內加大黃一兩二分

桂枝加厚朴杏仁湯

治桂枝湯證而胸滿微喘者

於本方內加厚朴二兩四分二厘五毫杏仁五十

個六分

烏頭桂枝湯

治腹中絞痛手足逆冷或不仁或身疼
痛者

烏頭五枚一錢五分

右一味以蜜二斤七錢五分煎減半去滓以桂
枝湯五合五分解之煎得一升一合初服

二合二分不知即服三合三分

不知復加

至五合五分

長圭翁曰此證非術知漸練則未嘗
易得也

桂枝加附子湯

治桂枝湯證而支節微痛及惡寒者
於本方內加附子一枚三分二厘

桂枝加龍骨牡蠣湯

治桂枝湯證而胸腹有動者

於本方內加龍骨牡蠣各三兩六分三重

桂枝加芍藥生薑人蔘湯

治桂枝湯證而心下痞鞭及拘攣嘔者

於本方內加芍藥生薑各一兩二分人蔘

三兩六分三重

七毛

小建中湯

治裏急腹皮拘急及急痛者

桂枝三兩五分甘草三兩同生薑三兩同

大棗十二枚五分芍藥六兩一錢膠飴一升

四錢

右六味以水七升一合煮取三升六分去滓

內膠飴更上微火消解

是則十歸劑而五歸量也

通三錢五分五厘
重三錢六厘

黃耆建中湯

治小建中湯證而自汗盜汗者

於小建中湯方內加黃耆一兩半

二分五厘
五毫

大建中湯

治胸腹大痛心下痞鞭腹皮起如有頭足及乾嘔者

蜀椒二合

五分

乾薑四兩

一錢五分

人蔘二兩

八分

右三味以水四升

一合三升

煮取二升

六分

去

滓內膠飴一升

八錢

微火煎取一升半

五分

是則五歸劑而三歸量也

通二錢五分五厘

人蔘湯

治心下痞鞭小便不利或急痛者

人蔘

甘草

乾薑

朮各三兩

七分二重

右四味以水八升

一合三勺

煮取三升

四分

是則七歸劑而六歸量也

通三錢九分二重二毛

桂枝人蔘湯

治人蔘湯證而上衝急迫劇者

桂枝四兩

八分

甘草四兩

同

朮三兩

六分三重七毛

人蔘三兩

同

乾薑三兩

同

右五味以水九升

一合

煮取五升

是則八歸劑而六歸量也

通三錢六分二重一毛

苓薑朮甘湯

治悸而小便自利腰中冷如坐水中若

疼重者

茯苓四兩

九分

乾薑四兩

同

朮二兩

四分八重五毛

甘草二兩

同

右四味以水五升一合二勺煮取三升七勺
是則七歸劑而四歸量也通二錢九分二重

苓桂朮甘湯

治悸而上衝起則頭眩小便不利者

茯苓四兩一錢一分桂枝三兩八分朮二兩五分

甘草二兩五分六毫

右四味以水六升一合煮取三升五勺

是則六歸劑而六歸量也通二錢二分二重

苓桂甘棗湯

治悸而欒急上衝者

茯苓半斤一錢二分桂枝四兩六分二重甘草三

兩四分六毫大棗十五枚八重

右四味以水一斗一合二勺先煮茯苓減二

升二勺內諸藥煮取三升三勺七勺

是則十一歸劑而八歸量也

通三錢八分六厘四毛

麻黃湯

治喘而胸滿頭痛發熱惡風或身體疼者

麻黃三兩

二錢

桂枝二兩

六分

甘草一兩

三分

杏仁七十個

一錢三分

右四味以水九升

八分

煮取二升半

五勺

是則五歸劑而五歸量也

通三錢八分

麻黃加朮湯

治麻黃湯證而小便不利者

於本方內加朮四兩

一錢三分

甘草一兩

三分

小青龍湯

治咳喘嘔逆上衝頭痛發熱惡風者

麻黃三兩

三分

芍藥三兩

同

乾薑三兩

同

桂枝三兩

同

甘草三兩

同

細辛三兩

同

半夏半升

六分八重

五味子半升

八分六重六毛

右八味以水一斗

一合四勺

煮取三升

四勺

是則十五歸劑而七歸量也

通三錢五分八重六毛

大青龍湯

治喘及胸滿煩渴上衝或身疼惡風者

麻黃六兩

八分五重

桂枝二兩

二分八重

甘草二兩

同

杏仁四十個

二分八重

生薑三兩

四分八重

大棗十二

枚

四分二重

石膏雞子大

一錢二分三重

右七味以水九升

一合五勺

煮取三升

四勺八毛

是則十二歸而六歸量也

通三錢三分八重重三錢七分

越婢湯

治大青龍湯證而不胸滿上衝或拘急者

麻黃六兩

一錢二重

石膏半斤

一錢三分六重

甘草二兩

三分四重

生薑三兩

五分之一重

大棗十五枚

六分三三七毛

右五味以水六升

一合五

煮取三升

七合五

是則十歸劑而四歸量也

通三錢三分五重七毛重三錢八分六重七毛

越婢加朮湯

治越婢湯證而小便不利者

於本方內加朮四兩

六分八重

越婢加朮附湯

治越婢加朮湯證而支節微痛及惡寒

者

於越婢加朮湯方內加附子一枚

二分二重

越婢加半夏湯

治越婢湯證而嘔逆者

於本方內加半夏半升

一錢二重

葛根湯

治項背強急及喘上衝發熱或身疼惡風者

葛根四兩

七分五釐

麻黃三兩

五分六釐

桂枝二

兩

三分七釐

芍藥三兩

五分六釐

甘草二兩

三分七釐

生薑三兩

五分六釐

大棗十二枚

五分六釐

右七味以水一斗

一合六分

煮取三升

八分

葛根加半夏湯

是則九歸劑而六歸量也

通三錢一分七釐
東三錢七分七釐也

治葛根湯證而嘔逆者

於本方內加半夏半升

一錢二分
三釐

葛根黃連黃芩湯

治項背強急心中煩悸心下痞或下利者

葛根半斤

一錢五分

黃連三兩

五分六厘

黃芩二兩

三分七厘

甘草二兩

同

右四味以水八升

一合

煮取二升

四

是則九歸劑而五歸量也

通二錢分二厘

小柴胡湯

治胸脇苦滿心下痞鞭嘔逆或寒熱往來者

柴胡半斤

參

黃芩三兩

四

人參三兩

同

甘草三兩

同

生薑三兩

同

大棗十二枚

半夏半升

六分

右七味以水一斗二升

一合

煮取六升

八

去滓再煎取三升

四

是則十五歸劑而七歸量也

通二錢九分四厘
重三錢二分八厘

柴胡加芒消湯

治小柴胡湯證而苦滿難解者

於本方內加芩消六兩

六分
八重

柴胡加龍骨牡蠣湯

於小柴胡湯方內加龍骨牡蠣各三兩

三分
四重

晁敬曰柴胡加龍骨牡蠣湯其名正而方不正也以他例照監之是則小

柴胡湯而加龍骨牡蠣者也於是考其所主治者亦當本方證而胸腹有動者主之今試之于手徵諸於術間有小柴胡湯證而胸腹有動者乃作此劑與之其應如響以是吾黨列于正方而使用之以待後之君子而已

柴胡桂枝湯

治小柴胡湯桂枝湯二方證相合者

柴胡四兩

八分五重

桂枝一兩

二分二重

黃芩一兩

同

人蔘一兩

同

甘草一兩

同

芍藥一兩半

三分一重八毛

生薑一兩半

同

大棗六枚

同

半夏

二合半

六分三重七毛

右九味以水七升

一合二勺五才

煮取三升

四勺八才

是則八歸劑而六歸量也

通三錢九分六厘三毛重三錢二分八厘一毛

柴胡桂枝乾薑湯

治小柴胡湯證而不嘔逆痞鞅而上衝

渴胸腹有動者

柴胡半斤

九分

桂枝三兩

三分四重

乾薑三兩

同

黃芩三兩

同

牡蠣三兩

同

甘草二兩

二分二重

六毛

枳實根四兩

四分五重

右七味以水一斗二升

一合七勺

煮取六升

八勺五才

去滓再煎取三升四勺

是則十五歸劑而七歸量也通三錢九分三厘六

大柴胡湯

治小柴胡湯證而心下痞鞕腹滿拘
攣者

柴胡半斤八分四釐 黃芩三兩三分一釐 芍藥三

兩同 大棗十二枚同 半夏半升六分三釐 生

薑五兩四分 枳實四枚四分 大黃二兩一分

右八味以水一斗二升一合 煮取六升八分

去滓再煎取三升四分

是則十六歸劑而七歸量也通三錢七分二釐

小承氣湯

治腹滿心下結實者

大黃四兩一錢三分 厚朴二兩六分 枳實三枚

一錢
二重

右三味以水四升一合三勺煮取一升二合

三勺
八分

是則五歸劑而三歸量也通三錢六重

厚朴三物湯

治小承氣湯證而腹滿甚者

厚朴八兩一錢七分大黃四兩八分四釐枳實五枚八分

一錢
二重

右三味以水一斗二升一合先煮二味取

五升七勺內大黃煮取三升四勺

是則八歸劑而七歸量也通三錢六分一重

厚朴七物湯

治腹滿心下結實上逆嘔者

厚朴半斤一錢四釐甘草三兩三分大黃三兩六分

同枳實五枚六分桂枝二兩二分大棗十枚

三分二重生薑五兩六分

右七味以水一斗一合煮取四升六分

是則十三歸劑而六歸量也通三錢一重三七重三錢六分六重三七

大承氣湯

治腹堅滿若下利臭穢者

大黃四兩六分厚朴半斤一錢三分枳實五枚

八分芒硝三合二錢

右四味以水一斗二合先煮二物取五升

二合內大黃煮取二升四合去滓內芒硝更

上微火消解

是則十歸劑而五歸量也通三錢八分九重

大黃黃連瀉心湯

治心中煩悸者

大黃二兩

一錢七分

黃連一兩

八分五厘

右二味以麻沸湯二升一合漬之須臾絞去滓

是則二歸劑而二歸量也

通二錢五分五厘

大黃黃連甘草湯

大黃

四錢

黃連

二錢

甘草

二錢

右三味以水二合煮取一合

晁敬曰此方古書不載三翁別無其傳矣竊考大黃黃連瀉心湯及大黃甘草湯治効明驗故取其徵成方者也所其主治亦全與二方之證相照宜得其腹狀如夫林鍾丸毒之緩者也已

瀉心湯

治心中煩悸心下痞及心氣不定者

大黃二兩一錢二分黃連一兩五分六厘黃芩一

兩同

右三味以水三升一合煮取一升三升

是則三歸劑而三歸量也通三錢二分六厘二毛

附子瀉心湯

治瀉心湯證而支節微痛及惡寒者

於瀉心湯方內加附子一枚八分

大黃附子湯

治腹絞痛及惡寒者

大黃三兩一錢二分附子三枚一錢五分細辛二兩

六分

右三味以水五升一合二分煮取二升五分

是則五歸劑而四歸量也通三錢二分三厘

大黃甘遂湯

治小腹滿如敦狀或小便微難若經水不調者

大黃四兩^{一錢七分}甘遂二兩^{八分五厘}阿膠二兩^同

各三味以水三升^{一合}煮取一升^{五合}

是則四歸劑而二歸量也^{通三錢四分}

大黃牡丹湯

治臍下堅塊按之即痛及便膿血者

大黃四兩^{六分}桃仁五十個^{四分}芒消三合

^{一錢二分}瓜子一升^{二錢}牡丹三兩^{五分一厘}

各五味以水六升^{一合}煮取二升^{五合}去滓

內芒消再煎沸

是則十歸劑而四歸量也^{通三錢五分九厘重四錢七分九厘}

大黃甘草湯

治痞而急迫者

大黃四兩

二錢二分
六重六毛

甘草一兩

五分六毛

右二味以水三升

一合

煮取一升

三寸

是則三歸劑而三歸量也

通二錢八分三厘二毛

調胃承氣湯

治大黃甘草湯證而實者

大黃四兩

一錢七分

甘草二兩

八分五厘

芒消半觔

三錢四分

右三味以水三升

一合五寸

煮取一升

五寸

去滓

內芒消更上微火煮令沸

是則四歸劑而二歸量也

通二錢五分五厘
重五錢九分五厘

桃核承氣湯

治小腹急結而上衝者

桃仁五十個

六分六厘
六毛

桂枝二兩

五分六厘
五毛

甘草

二兩

同

大黃四兩

一錢一分
三厘

芒硝二兩

五分六厘
五毛

右五味以水七升一合煮取二升半五合去

滓內芒硝更上微火沸

是則六歸劑而五歸量也通三錢九分二厘八毫重三錢四分九厘四毫

大烏頭煎

治毒繞臍絞痛或自汗手足厥冷者

烏頭大者五枚二錢一分

右一味以水三升一合煮取一升五合去滓

內蜜二升錢四煎令水氣盡取二升一合

是則八歸劑而二歸量也

長圭翁曰曩者有一病人先生診之

曰是大烏頭煎證也意雖了之不可

謂之得也近徵之於術漸識大烏頭

煎者矣又按大烏頭煎證不備而有

大烏頭煎與薏苡附子敗醬散之證

相照而得之者故書於斯以待君子
至有知其小者知其大者之區別各
稍之可知先生之妙也

玄武湯

治悸而拘攣肉瞋筋惕小便不利四肢
拘痛及惡寒者

茯苓三兩八分五釐芍藥三兩同

生薑三兩同

朮二兩

五分六釐六毛

附子一枚

四分二釐五毛

右五味以水八升

一合三勺三升

煮取三升

四勺八毛

是則六歸劑而六歸量也

通二錢六分九釐一毛重三錢五分四釐一毛

附子湯

治身體疼痛小便不利悸而拘攣心下
痞鞅者

附子二枚

六分三釐七毛

茯苓三兩

同

芍藥三兩

同人漢二兩四分二重五毛 朮四兩八分五重

右五味以水八升一合三勺三勺 煮取三升四分八勺 是則八歸劑而六歸量也 通三錢二分八重六毛

小陷胸湯

治小結胸者

黃連一兩四分二重五毛 半夏半升二錢五分五重 括蕒實

大者一個八分七重

右三味以水六升一合五勺 先煮括蕒實取三升七勺 去滓內諸藥煮取二升五勺 是則四歸劑而四歸量也 通三錢八分二重五毛

大陷胸湯

治結胸從心下至小腹鞭滿者

大黃六兩一錢二分七重 芒硝一升四錢二分 甘遂一錢

別末一分二重五毛

右三昧以水六升一合先煮大黃取二升

五去滓內芒硝煮一兩沸內甘遂末

是則八歸劑而四歸量也通一錢三分九厘五毫重五錢五分九厘五毫

半夏瀉心湯

治心下痞鞭而嘔逆及腹中雷鳴者

半夏半升七分黃芩三兩三分乾薑三兩同

人蔞三兩同甘草三兩同大棗十二枚

三分黃連一兩一分

右七味以水一斗一合六分煮取六升一合去

滓再煎取三升五

是則十三歸劑而六歸量也通三錢八分六厘

甘草瀉心湯

治半夏瀉心湯證而急迫者

於半夏瀉心湯方內更加甘草一兩一分

生薑瀉心湯

治半夏瀉心湯證而嘔吐者

於半夏瀉心湯方內減乾薑二兩二分加

生薑四兩五分

厚朴生薑半夏甘草人蔘湯

治胸腹滿而嘔吐者

厚朴半斤一錢三分生薑半斤同半夏半升

一錢甘草二兩三分人蔘一兩一分

各五味以水一斗一合六勺煮取三升五分

是則十歸劑而六歸量也通三錢八分九厘

重四錢二分五厘

黃連湯

治心中煩悸心下痞鞭嘔逆上衝者

黃連三兩三分桂枝三兩同甘草三兩同

乾薑二兩同大棗十二枚三分人蔘二兩九厘

二分
半夏半升七分
六重八重

右七味以水一斗一合煮取六升七分

是則十三歸劑而八歸量也通二錢九分九厘

乾薑黃連黃芩人蔞湯

治心中煩悸心下痞鞭或嘔逆者

乾薑三兩六分三厘黃連三兩同黃芩三兩

同
人蔞三兩同

右四味以水六升一合煮取二升五分

是則八歸劑而四歸量也通二錢五分四厘八毛

黃連阿膠湯

治心中煩悸心下痞而不得眠或拘攣

者

黃連四兩一錢一分黃芩二兩五分六厘芍藥二

兩同阿膠三兩八分雞子黃二枚一錢二分

右五味以水五升一合六分先煮三物取二升六分去滓內膠烱盡少冷內雞子黃攪令相得

是則六歸劑而三歸量也通三錢一分二厘二毛

黃芩湯

治心下痞腹拘急及下利者

黃芩三兩八分大棗十二枚同芍藥二兩

五分六厘甘草二兩同

右四味以水一斗一合六分煮取三升五分

是則六歸劑而六歸量也通三錢一分三厘二毛

黃芩加半夏生薑湯

治黃芩湯證而嘔逆者

於本方內加半夏半升一錢七分生薑三兩八分

六物黃芩湯

治心下痞鞭嘔逆及下利者

黃芩三兩

一分五厘

人蔞三兩

同

乾薑三兩

同

大棗十二枚

一分五厘

桂枝一兩

一分七厘

半夏半升

一錢二重

右六味以水七升

一合四分

煮取三升

六分

是則十歸劑而五歸量也

通三錢二分三厘

木防已湯

治身體腫心下痞鞭煩渴上衝者

木防已三兩

六分三厘七毫

桂枝二兩

四分二厘五毫

人蔞

四兩

一分五厘

石膏雞子大

一錢六分九厘五毫

右四味以水六升

一合五毫

煮取二升

五毫

是則八歸劑而四歸量也

通三錢六分七毫

木防已去石膏加茯苓芒硝湯

治木防已湯證而不煩渴心下痞堅而

悸者

於本方內去石膏加茯苓四兩八分芒硝

三合一錢五分

防已茯苓湯

治身體腫四肢聶聶動汗出上衝者

防已三兩五分黃耆三兩同桂枝三兩同

茯苓六兩一錢甘草二兩四分

右五味以水六升煮取二升五勺

是則十歸劑而四歸量也通二錢八分九厘

防已黃耆湯

治身體腫重汗出小便不利者

防已四兩五分六厘黃耆五兩七分八厘朮三兩四分二厘

大棗十二枚四分二厘生薑三兩同甘草

二兩二分八厘

枳朮湯

右六味以水六升

一合五勺

煮取二升

五勺

是則十二歸劑而四歸量也

通二錢四分四毛
重二錢八分二厘九毛

治心下堅大小便不利者

枳實七枚

一錢九分
八重

朮二兩

五分六厘
六毛

右二味以水五升

一合

煮取三升

六勺

是則六歸劑而五歸量也

通二錢五分四厘六毛

茯苓飲

治胸滿心下痞鞭而悸小便不利吃逆

而嘔者

茯苓三兩

六分三厘
七毛

人蔘三兩

同

朮三兩

同

枳實二兩

四分二厘
五毛

橘皮二兩半

五分三厘

生薑四

兩

八分五厘

右六味以水六升

一合五勺

煮取一升

八合

四分五毛

是則八歸劑而四歸量也

通二錢八分六厘六毫
重三錢七分一厘六毫

朱雀湯

治毒在胸腹掣痛者

芫花一兩

八分五厘

甘遂一兩

同

大戟一兩

同

右三味搗篩以水一升五合

一合五毫

先煮大

棗肥者十枚

四錢二分五厘

取八合

八分

去滓內藥

末

是則二歸劑而本量大棗十枚本劑也

通二錢五分五厘

石膏黃連甘草湯

治心胸煩悸而煩渴急迫者

石膏

五兩

黃連

一兩

甘草

一兩

右三味以水三合煮取一合五勺

晁敬曰此奇方也方書無載雖然其

方正而効如神故今連入正方中云
爾

丸散方

大簇

治心下痞鞭小結毒者

大黃二十錢 黃芩十錢 人蔞十錢

定三方

卷上

三十四

右三味為末糊丸

夾鍾

治腹中有塊心下痞鞭者

大黃二十錢 硝石十錢 人蔞 甘草各五錢

右四味為末糊丸一方以苦酒三合

先煮大黃減二合內甘草人蔞煮如飴

狀而下冷內硝石為圓

姑洗

治痰喘及肩背痛者

大戟 甘遂 白芥子 各一兩

右三味為末糊丸以生薑汁沃白飲送下之

林鍾

治心中煩悸小結毒者

大黃

二十錢黃連

甘草

各十錢

右三味為末糊丸

夷則

治臍邊有毒而凝堅者

大黃 四錢硝石 六錢浮石 四錢赤石脂

八錢

右四味為末糊丸

若無赤石脂以代赭石代之

南呂

治痰飲咳嗽者

大黃八錢 黃芩四錢 甘遂二錢 青礞石五錢 以硝石五錢熬之

右四味為末糊丸

應鍾

治毒在頭者

定方脈經卷三

三十六

大黃六十錢 芎藭三十錢

右二味為末以清酒或白湯送下之

黃鍾

治瀉心湯證而緩者

大黃十錢 黃芩五錢 黃連五錢

右三味為末糊丸

大呂

治心腹卒暴毒者

大黃 巴豆 乾薑 各四錢

右三味為末糊丸或蜜丸

文調

治胸腹結毒者

杏仁 錢四 巴豆 赤石脂 代赭石 各二錢

右四味為末糊丸或蜜丸 若無赤石脂 加倍代赭石

武調

治惡毒痼疾及骨節疼痛者

巴豆 輕粉 各二錢 梅肉 梔子 各七錢 五分

右四味先燒梅肉梔子別研巴豆合治為散今為糊丸

大卷

治結胸若項背强者

大黃

十六錢

葶藶

杏仁

硝石

各十二錢

右四味為末合研如脂別內甘遂末一

錢

七分六釐

白蜜二勺水二合煮取一合今

和散為丸

大咸

治拘攣上衝心下悸或經水有變若胎

動者

定馬方種二卷上

桂枝

茯苓

桃仁

芍藥

牡丹皮

各六錢五分

右五味為末煉蜜和丸

大韶

治堅塊或腹中結實者

大黃

八十錢

硝石

百二十錢

右二味為末糊丸

大夏

治毒在胸咽而吐下如膿汁者

桔梗

貝母

各一錢五分

巴豆

五分

右三味為末以白湯送下之

大蘗

治惡毒瘡者

鹿角

蝮蛇

津蟹

各霜三錢

右三味為末以清酒送下之

大武

治毒同武調而難解者

水銀

三錢五分

硝石

礬石

各六錢

海鹽

二錢

右四味先研硝石礬石乃合四味內瓦盆中以茗碗覆之以泥封之安架火上而自下燒之半日許既而取其所屬著

茗碗之霜以棗肉為丸服之日三分或
五分待毒氣微出口中而服武調或文
調取下利

定正方極卷之上終

