





定正方極卷之中

阿岐 東洞吉益先生 著

東都 長圭瀨丘先生校正

小泉 桐谷岡田先生監定

晁敬曰以下數十方實非朝使夕用者矣執刀圭中當作劑時諸方錯雜煩亂不簡今暫列之於此而具便覽

亦唯在省其勞而已豈敢謂敷諸公乎但有識者辨別之可也

桂枝附子湯

治桂枝去芍藥湯證而身體疼痛不能自轉側者

桂枝四兩七分五厘五毛附子三枚八分五厘五毛生薑三兩三分七厘六毛
大棗十二枚同甘草二兩三分七厘七毛

右五味以水六升一合五勺煮取二升五勺

是則九歸劑而四歸量也

通二錢五分八毛重三錢七厘四毫

桂枝附子去桂加术湯

治桂枝附子湯證而小便自利不上衝

者

於桂枝附子湯方內去桂枝加术四兩

七分五厘五毛

桂枝去桂加苓术湯

治桂枝湯證而悸小便不利不上衝者

於桂枝湯方內去桂枝加茯苓术各三

兩六分三厘七毛

桂枝加苓术附湯

於桂枝湯方內加茯苓术各三

兩六分三厘七毛

附子一枚

三分二厘

晁敬按 東洞翁創業之時偶見桂枝去桂加芩术湯之證中頗有桂附之毒者也為作此劑與之極得其効後以為常二翁從事于茲矣以予觀之殆似尤人而效之者雖然三翁術知漸練無一所過則千歲之下復輔張機之術其功不為鮮矣故今錄之以告後之方技者此佗吉家紛雜之方無足取者一掃勿顧

桂薑棗草黃辛附湯

治桂枝去芍藥湯麻黃附子細辛湯二方證相合者

桂枝三兩五分六釐生薑三兩同大棗十二枚

同 麻黃 甘草 細辛各二兩三分七釐

附子一枝二分八重

右七味以水一合煮取二升四勺

是則九歸劑而五歸量也

通二錢五分三重一毛重三錢九重一毛

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣湯

治桂枝去芍藥湯證而胸腹動劇者

桂枝三兩四分二重五毛

生薑三兩同

蜀漆三兩

大棗十二枚同

甘草二兩二分八重

龍骨四

桂枝甘草湯五分八重五毛

右七味以水一斗二升煮取三升四勺

是則十二歸劑而七歸量也

通二錢八分二重六毛重三錢二分二重三毛

桂枝甘草湯

治上衝急迫者

桂枝四兩二錢三分六毛

甘草二兩一錢一分三重

右二味以水三升一合煮取一升五勺

是則三歸劑而二歸量也通三錢三分九厘六毫

桂枝甘草附子湯

治桂枝甘草湯證而骨節疼煩小便不利者

桂枝四兩

一錢一分
三分

甘草二兩

五分六厘
六毫

術二兩

同附子二枚

五分八厘

右四味以水六升

一合五勺

煮取三升

七勺五才

是則六歸劑而四歸量也通三錢一分一厘二毫

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

治胸腹有動急迫者

桂枝一兩

五分六厘
六毫

甘草二兩

一錢一分
三分

龍骨二

同附子二枚

五分八厘

右四味以水五升

一合六勺
六才

煮取二升半八分

是則三歸劑而三歸量也通三錢九分一厘六毫

茯苓甘草湯

治悸上衝而嘔者

茯苓二兩八分五毫桂枝二兩同生薑三兩一錢二分

甘草一兩四分五毫

右四味以水四升一合煮取二升五勺

是則四歸劑而四歸量也通二錢一分二毫五毫重三錢四分

茯苓杏仁甘草湯

卷中

處方本二

卷中

治悸而胸滿或喘者

茯苓三兩一錢三分五毫杏仁五十個一錢二分甘草一

兩四分三毫五毫

右三味以水一斗一合煮取五升五勺

是則四歸劑而十歸量也通三錢九分

苓桂五味甘草湯

治悸上衝咳而急迫者

茯苓四兩六分桂枝四兩同甘草三兩五分

五味子半升三分

一錢

右四味以水八升一合三勺煮取三升四勺

三分

是則十歸劑而六歸量也通三錢一分七厘

苓甘五味薑辛湯

治苓桂五味甘草湯證而不上衝痰飲
滿者

定正方本二卷中

茯苓四兩六分甘草 乾薑 細辛各三

兩五分五味子半升一錢

三分

右五味以水八升一合三勺煮取三升四勺

八分

是則十歸劑而六歸量也通三錢五分一厘

苓甘薑味辛夏湯

治苓甘五味薑辛湯證而嘔逆者

茯苓四兩五分六厘

甘草

細辛

乾薑各

三兩四分二厘
五毫半夏半升八分五厘
五毫五味子半升一錢八
毫

右六味以水八升一合三勺
三分煮取三升四勺
八分

是則十二歸劑而六歸量也通三錢七分六厘三
毫

苓甘薑味辛夏仁湯

治苓甘薑味辛夏湯證而胸滿或喘者
於前方內加杏仁半升一錢八
毫

苓甘薑味辛夏仁黃湯

治苓甘薑味辛夏仁湯證而腹中微結
者

於前方內加大黃三兩四分二厘
五毫

茯苓澤瀉湯

治悸小便不利上衝及嘔吐渴欲飲水
者

茯苓半斤一錢三分澤瀉四兩六分
八厘生薑四兩

同

桂枝二兩三分四厘甘草二兩同术三兩五分一厘

右六味以水六升一合一分煮取三升五分五厘內

澤瀉再煮取二升半四分六厘

是則十歸劑而六歸量也通三錢一分九厘
重三錢九分七厘

澤瀉湯

治苦冒眩小便不利者

澤瀉五兩二錢一分二厘五毫术二兩八分五厘

右二味以水二升一合煮取一升五分五厘

是則四歸劑而二歸量也通三錢九分七厘五毫

五苓散

治消渴小便不利若渴欲飲水水入則吐者

澤瀉一兩六錢半一錢一分猪苓十八錢六分六厘术

十八錢同茯苓十八錢同桂枝半兩四分二厘五毫

右五味為末以白飲和服方寸七
是則二歸劑也通三錢四分四厘五毫

茵陳五苓散

治發黃兼五苓散證者

茵陳蒿末十分五錢五苓散五分二錢
右二物以白飲和服方寸七

猪苓湯

定正方集

卷中

十

治小便不利渴欲飲水若便膿血者
茯苓 猪苓 阿膠 滑石 潤濕各
一兩五分蜜六毫

右五味以水四升一合三勺先煮四味取二

升六勺去滓內膠烊消

是則二歸劑而三歸量也通三錢八分三厘

八味丸

治臍下不仁小便不利者

乾地黃八兩

九分
六毛

山茱萸 薯蕷各四兩

四分
五董澤瀉

茯苓

牡丹皮各三兩

三分
四董桂

枝

附子各二兩

二分
六毛

若八味末之煉蜜和丸梧子大酒下十五丸日再服

是則十五歸劑也

通三錢二分七重八毛

麻黃甘草湯

治喘急息迫者

麻黃四兩

二錢二分
六董六毛

甘草二兩

一錢一分
三分

右二味以水五升

一合二勺
五董

煮取三升

七勺
五才

是則三歸劑而四歸量也

通三錢三分九重六毛

麻黃附子甘草湯

治麻黃甘草湯證而身微痛及惡寒者

麻黃二兩一錢一分
三分附子一枚八分
五分甘草二兩

一錢一分
三分

右三味以水七升一合七勺
五升煮取三升七勺
五升是則三歸劑而四歸量也通三錢一分二厘

麻黃附子細辛湯

治麻黃附子甘草湯證而不急迫有痰飲之變者

麻黃二兩一錢一分
三分細辛二兩同附子一枚

八分
三分

右三味以水一斗一合六勺
六升煮取三升八勺
四升是則三歸劑而六歸量也通三錢一分二厘

麻黃杏仁甘草石膏湯

治麻黃甘草湯證而胸滿煩渴者

麻黃四兩八分
五分杏仁五十個一分甘草二兩

四分二厘 石膏半斤

一錢
七分

右四味以水七升

一合
四勺

煮取二升四勺

是則八歸劑而五歸量也

通三錢五分七厘五毛

麻黃杏仁薏苡甘草湯

治麻黃杏仁甘草石膏湯證而浮腫不

煩渴者

麻黃四兩

八分
五重

杏仁二兩

四分
五重

甘草二兩

定方卷二

卷中

十三

同 薏苡仁半斤

一錢六分
五重

右四味以水五升

一合六勺
六才

煮取二升

六勺

是則八歸劑而三歸量也

通三錢三分五厘

牡蠣湯

治麻黃甘草湯證而胸腹有動者

牡蠣四兩

九分
七厘

麻黃四兩

同
七分

蜀漆三兩

二厘
七分

甘草二兩

四分八厘

五毛

若四味以水八升一合五勺煮取二升四勺

是則七歸劑而五歸量也通三錢一分五厘三毫

紫胡去半夏加括蔞根湯

治小紫胡湯證而渴不嘔逆者

於本方內去半夏加括蔞根四兩四分五厘

白虎湯

治大渴引飲煩躁者

卷中

定正方經

卷中

十四

石膏一斤二錢七分

二厘

知母六兩一錢

二厘

甘草二兩一錢

二厘

粳米六合二錢

一厘

若四味以水一斗五升一合五勺煮取八升八勺

是則十歸劑而十歸量也通六錢一分九厘

白虎加人蔘湯

治白虎湯證而心下痞鞕者

於本方內加入蔘三兩

五分一厘

白虎加桂枝湯

治白虎湯證而上衝者

於本方內加桂枝三兩五分一厘

抵當湯

治小腹鞭滿或經水有變者

水蛭三十個一錢蟲蟲三十個一錢桃仁二

十個五分三厘大黃三兩一錢七分

良方卷中

十五

右四味以水五升一合二勺煮取三升五才七勺

是則三歸劑而四歸量也通四錢三分三厘

橘皮大黃朴消湯

治心胸間有結毒而噦逆者

橘皮一兩八分五厘大黃二兩七分朴消二兩同

右三味以水一大升一合煮取小升五勺

是則二歸劑而本量也通二錢五分五厘
重四錢二分五厘

大黃消石湯

治腹中有堅塊而發黃者

大黃四兩六分八重黃蘖四兩同消石四兩同

梔子十五枚

五分三重五毛

右四味以水六升一合二勺煮取三升六勺去滓
內消石更煮取一升二勺

是則十歸劑而五歸量也

通一錢八分九重五毛重二錢五分七重五毛

定正方逐二卷中

十六

甘草湯

治毒急迫而咽急痛者

甘草二兩

三分三錢

右一味以水三升一合五勺煮取一升五合七勺

是則本劑而二歸量也

桔梗湯

治甘草湯證而有膿或粘痰者

甘草二兩一錢七分桔梗一兩八分五釐

右二味以水三升一合五勺煮取一升五勺

是則二歸劑而二歸量也通二錢五分五釐

排膿湯

治膿血粘痰急迫者

甘草二兩六分八釐桔梗三兩一錢二釐生薑一兩三分四釐

大棗十枚八分五釐

三三二兩卷中

右四味以水三升一合五勺煮取一升五勺

是則五歸劑而二歸量也

通二錢五分五釐
重二錢八分九釐

芍藥甘草湯

治拘攣急迫者

芍藥四兩一錢一分三釐甘草四兩同

右二味以水三升一合五勺煮取一升半七勺

是則六歸劑而二歸量也通二錢三分六釐

芍藥甘草附子湯

治芍藥甘草湯證而支節微痛及惡塞者

芍藥三兩

一錢
二重

甘草三兩

同

附子一枚

五分
一重

右三味以水五升

一合六勺
六升

煮取一升半

四勺
九升

是則五歸劑而三歸量也

通三錢五分五厘

甘遂半夏湯

三二十一
逐二
三七

別正方本
卷七
十八

治芍藥甘草湯證而心下鞶滿或嘔者

芍藥五枚

一錢
六分

甘草指大一枚

同

半夏十

二枚

同

甘遂三枚

五分
二重

右四味以水二升

二合
三升

煮取半升

五勺
去滓

以蜜半升

五勺
和藥汁

煎取八合

勺

是則二歸劑而本量也

通五錢三分三厘

甘麥大棗湯

治急迫而狂驚者

甘草三兩六分三厘七毛五分三釐小麥一升錢大棗十枚

五分三釐

右三味以水六升一合五分煮取三升七分五釐是則八歸劑而四歸量也通五錢一分六厘七毛

甘草粉蜜湯

治吐涎吐蟲心痛發作有時者

三三二十一

十七

定理方解

卷中

十九

甘草二兩一錢粉一兩八分蜜四兩三錢

七分五厘四分

右三味以水三升一合五分先煮甘草取二升

二合去滓內粉蜜攪令和煎如薄粥

是則二歸劑而二歸量也通三錢五分五厘

生薑甘草湯

治唾涎沫心下痞鞭強急者

生薑五兩

一錢六釐

甘草四兩八分

人一錢五分

生薑三兩六分

三分

七毛 大棗十五枚七分九毫

六毫

右四味以水七升一合四勺煮取三升六勺

是則八歸劑而五歸量也

通二錢二分八厘三毫重三錢三分四厘三毫

東洞翁曰此證苦胸腹中如施網羅

所以甘草大棗多也

甘草乾薑湯

治煩躁多涎唾或厥者

甘草四兩一錢一分七毫乾薑二兩八分五毫

右二味以水三升一合煮取

半勺

是則四歸劑而三歸量也

通二錢五分五毫

四逆湯

治四肢厥逆身體疼痛或下利清穀小

便清利者

甘草二兩一錢一分三毫乾薑一兩半八分五毫附子一

枚八分五釐

右三味以水三升一合五勺煮取一升二合六勺是則三歸劑而二歸量也通三錢八分三厘

四逆加人蔘湯

治四逆湯證而心下痞鞭者

於本方內加人蔘一兩五分六釐六毛

茯苓四逆湯

治四逆加人蔘湯證而悸者

茯苓六兩一錢三分七釐五毫甘草二兩四分二釐五毫草薑一
兩半三分二釐五毫附子一枚同人蔘一兩二分一釐

右五味以水五升一合三勺五才煮取三升七勺是則八歸劑而四歸量也通三錢五分五厘

附子粳米湯

治腹中雷鳴切痛嘔吐者

附子一枚三分一重八毛半夏半升一錢二分五毫甘草一

兩二分一重五毫大棗十枚五分三毫粳米半升二錢七毫

若五味以水八升一合五勺煮米熟湯成去滓

溫服

是則八歸劑而六歸量也通四錢五分一重

梔子豉湯

治心中懊懨者

梔子十四枚一錢二分五重杏豉四合二錢一分

右二味以水四升一合三勺先煮梔子得二

升半八分九勺內豉煮取一升半四勺

是則四歸劑而三歸量也通三錢三分五毫

梔子甘草豉湯

治梔子豉湯證而急迫者

於本方內加甘草二兩八分五毫

梔子生薑豉湯

治梔子豉湯證而嘔者

於本方內加生薑五兩二錢二分
二重五毛

梔子枳實豉湯

治梔子豉湯證而胸滿者

枳實三枚五分一重梔子十四枚四分二重
九毛杏豉一升二錢

卷三

三

三

右三味以清漿水七升一合七勺空煮取四升一合內枳實梔子煮取二升五勺下豉更煮五六沸去滓

是則十歸劑而四歸量也通三錢三重九毛

梔子大黃豉湯

治梔子枳實豉湯證而實者

梔子十二枚五分三重枳實五枚一錢五重杏豉一升

大黃一兩二錢六分

二分一重

右四味以水六升一合五勺煮取二升五勺

是則八歸劑而四歸量也通四錢三分九重

茵陳蒿湯

治發黃心煩而實者

茵陳蒿六兩一錢七分

六分一重

梔子十四枚八分三重

六毛

大黃

二兩五分五毫

六毛

右三味以水一斗一合六勺先煮茵陳減六

六勺

升一合內二味煮取三升五勺

是則六歸劑而六歸量也通三錢一分二毛

梔子蘖皮湯

治心煩及身黃發熱者

梔子十五枚一錢七分

八毫

甘草一兩五分五毫

六毛

黃蘖

二兩一錢一分

三毫

右三味以水四升一合三勺
三分煮取一升半五勺
是則三歸劑而三歸量也通三錢四分七厘六毫

梔子厚朴湯

治胸腹滿而煩者

梔子十四枚七分一重厚朴四兩九分七重枳實四枚

九分
六釐

右三味以水三升半一合一勺煮取一升半五勺

三升半

木

是則七歸劑而三歸量也通二錢六分五厘

梔子乾薑湯

治心煩及乾嘔者

梔子十四枚

一錢六分
六釐六毫

乾薑二兩

一錢一分
三厘

右二味以水三升半一合一勺

六寸

煮取一升半五勺

是則三歸劑而三歸量也通三錢七分九厘六毫

瓜蒂散

治溫溫欲吐者

瓜蒂一分五分赤小豆一分五分

若二味各別擣篩為散已合治之取一
錢匕以杳豉一合用熱湯七合煮作稀
糜去滓取汁和散

小半夏湯

治嘔吐者

半夏一升二錢五分
五重生薑半斤一錢
七分

右二味以水七升一合
四兩煮取一升半三勺
重四錢三分五重

是則八歸劑而五歸量也

小半夏加茯苓湯

治小半夏湯證而脳悸者

於本方內加茯苓三兩六分三分
七毛

生薑半夏湯

治似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦心中
憤憤然無奈何者

生薑汁一升二分半夏半升二錢

右二味以水三升一合煮半夏取二升一合

內生薑汁煮取一升半七分

是則五歸劑而二歸量也

大半夏湯

定正方卷二

三十二

治嘔吐而心下痞鞕者

半夏二升三分

四分

人蔘三兩四分二厘

五毛

白蜜一升

三分

三釐

右三味以水一斗二升二合和蜜煮取二

升半四分

是則十二歸劑而六歸量也

通三錢分二厘五毛

晁敬按此腹狀有疔痛之證所以作

蜜劑也

半夏厚朴湯

治嘔吐而悸咽中如有炙繩者

半夏一升二錢四重厚朴三兩五分一重茯苓四兩六分八重

生薑五兩八分五重乾蘿蔔二兩三分四重

右五味以水七升一合四勺煮取四升八勺

是則十歸劑而五歸量也通三錢五分七毫重四錢四分二毫

吳茱萸湯

治胸滿心下痞鞭嘔者

人蔘三兩

四分二重五毛

生薑六兩八分五重

大棗十二

枚四分二重五毛

吳茱萸一升一錢七分

右四味以水七升一合四勺

煮取二升四勺

是則十二歸劑而五歸量也

通三錢五分五重重三錢四分

白頭翁湯

治熱利下重而心中煩悸者

白頭翁 黃連 黃芩 秦皮各三兩

六分量
七毛

右四味以水七升一合四勺煮取二升四勺

是則八歸劑而五歸量也通二錢五分四厘八毛

白頭翁加甘草阿膠湯

治白頭翁湯證而便膿血急迫者

定王方經

卷下
三十六

於本方內加甘草阿膠各二兩四分二厘五毫

五毫

右六味以水七升一合四勺煮取二升半五勺內

膠令消盡

是則八歸劑而五歸量也

通三錢三分五厘八毫

桂枝枳實生薑湯

治胸滿上逆嘔者

桂枝三兩

一錢二分

生薑三兩

同

枳實五枚

一錢六分

右三味以水六升一合五勺煮取三升七勺五分

是則五歸劑而四歸量也

通二錢九分
重四錢一分

枳實薤白桂枝湯

治胸背痛及胸腹滿者

枳實四枚六分厚朴四兩同

薤白半升一錢

桂枝一兩七分括薑實一枚三分

右五味以水五升一合六勺先煮枳實、厚朴

五勺

取二升六勺去滓內諸藥煮數沸

通二錢九分

是則十歸劑而三歸量也

通二錢九分

橘皮枳實生薑湯

治胸滿吃逆而嘔者

橘皮一斤

一錢一分枳實三兩

四分二厘

生薑半斤

三錢

右三味以水五升

一合二勺

煮取二升

五勺

是則十二歸劑而四歸量也

通三錢二重五毛
重三錢一分五重五毛

橘皮竹茹湯

治吃逆嘔而拘急者

橘皮二斤

三錢二分五重

大棗三十枚

一錢六分

甘草五兩

七分八毛

生薑半斤

一錢三分三重

人蔘一

兩

一分四毫

右六味以水一斗

一合六勺

煮取三升

五升

是則十二歸劑而四歸量也

通五錢四分五重五毛
重六錢五分八毫八毛

芎歸膠艾湯

治便膿血及腹中拘痛者

芎藭

阿膠

甘草各二兩

二分八毫

芎藥四

兩

五分六毫

艾葉

當歸各三兩

四分二毫

乾地

黃六兩

八分五毫

右七味以水五升

八分三才

清酒五升

八分三才

合煮

取三升_水去滓內膠烊消
是則十二歸劑而六歸量也通_{三錢二分六毛}

走馬湯

治胸腹有毒或痛者

巴豆二枚杏仁二枚

右二味以綿繩槌令碎熟湯二合捻取
白汁飲之

定正方極卷之下

大日本 阿岐

東洞吉益先生

著

東都

長圭瀨丘先生校正

小泉

桐谷岡田先生監定

晁敬曰以下數十方稍有不正者矣

蓋非長沙氏之傳方哉二千餘年之久是非實不可知也雖則不可知然

今以法證試之于午徵之於術毫與古人所云無有影響則不必可取明矣曩 東洞翁雖未明言亦非無疑焉至于 長圭翁活眼一開以為雞肋列之於附錄中我 桐谷先生夙遊其門傳其方術而復監定之於是予示得與聞之故今削之列後如左

桂枝去芍藥湯

治桂枝湯證而腹不拘攣者

於桂枝湯方內去芍藥

桂枝去芍藥加附子湯

治桂枝去芍藥湯證而支節微痛及惡

寒者

於桂枝去芍藥湯方內加附子一枚三分之二

桂枝去芍藥加皂莢湯

治桂枝去芍藥湯證而吐濁唾涎沫者

於桂枝去芍藥湯方內加皂莢二枚四分二
重五毛

桂枝二麻黃一湯

治桂枝湯證多麻黃湯證少者

桂枝一兩十
七銖 芍藥一兩
六銖 生薑一
六銖 麻黃

斛六
杏仁十六
個
甘草一兩
二銖
大棗五枚

右七味以水五升煮取二升

桂枝二越婢一湯

治桂枝湯證多越婢湯證少者

桂枝 芍藥 甘草 麻黃各十銖生薑
一兩 大棗四枚 石膏二十
三銖

右七味以水五升煮取二升

桂枝麻黃各半湯

治桂枝湯麻黃湯二方證相半者

桂枝一兩十銖 芍藥 生薑 甘草 麻

黃各一兩 大棗四枚 杏仁二十
個

右七味以水五升煮取二升

長圭翁曰有之哉此三方也以二字或各半題目其證則至於萬病蜂起其窮也必矣以是觀之古人不及

東洞先生一等

晁敬曰桂枝麻黃各半湯名之與方不正乎長圭翁已既辨之雖然如今偶有桂枝湯證而胸滿喘急者於是從紫胡桂枝湯方證而取其例乃作桂枝湯加麻黃杏仁各三兩與之應如影響丙未每得若證又復試之

無一有違凡故暫書其治効於斯而以備後評矣

黃耆桂枝五物湯

治桂枝湯證而嘔自汗盜汗不急迫者

黃耆三兩七分二厘八毛桂枝三兩同芍藥三兩

大棗十二枚同生薑六兩

一錢四分五釐五毫

右五味以水六升五分煮取二升

五勺

是則七歸劑而四歸量也

通二錢九分一厘二毛
重四錢三分六厘七毛

黃耆桂枝苦酒湯

治身體腫黃汗出拘攣上衝或發熱者

黃耆五兩

一錢四分一厘六毫

芍藥三兩

八分五厘

桂枝三兩

同

右三味以苦酒一升

二勺

水七升

一合四勺

相和煮取三升

六分

是則六歸劑而五歸量也

通三錢二分一厘六毛

半夏散及湯

治咽喉痛上衝急迫者

半夏 桂枝 甘草 各等分

各等分

右三味擣篩白飲和服方寸匕若不能散服者以水一升

一合

煎七沸內散兩方寸匕更煎三沸下火少少嚥之

茯苓戎鹽湯

治憒而小便不利者

茯苓半斤二錢术二兩六錢戎鹽彈丸大一
枚四分

右三味先將茯苓术煎成入鹽再煎
東洞翁曰此方煮法不審今依他例
宜以水六升一合五分煮取三升七分去滓內
戎鹽一二沸分溫三服

是則五歸劑而四歸量也通三錢七分八厘

葵子茯苓散

治小便不利而憒者

葵子三兩 茯苓三兩

右二味杵為散飲服方寸匕

猪苓散

治渴而憒小便不利者

猪苓 茯苓 木各等分

右三味杵為散飲服方寸匕

牡蠣澤瀉散

治身體腫腹中有動渴而小便不利者

牡蠣 澤瀉 括蔞根 蜀漆

海藻 离陸根 各等分

右七味異擣為散白飲和服方寸匕

括蔞瞿麥丸

治支節微痛及惡寒慄而渴小便不利者

茯苓 三兩 薯蕷 三兩 附子一枚 瞿麥一

兩 括蔞根 二兩

右五味末之煉蜜丸梧子大飲服三丸

麻黃醇酒湯

治喘而發黃或身疼者

麻黃三兩

三錢五分
五厘

右一味以美清酒五升一合二勺煮取二升

半
二勺

是則二歸劑而四歸量也

半夏麻黃丸

治喘而嘔者

半夏 麻黃各等分

文蛤湯

治煩渴而喘咳急迫者

文蛤五兩

八分五厘
石膏五兩 同

麻黃三兩

五分五厘

甘草三兩

同 生薑三兩 同

大棗十二枚

同 杏仁五十個

四分

右七味以水六升

一合

煮取二升

五分

右七味以水六升

一合

煮取二升

五分

是則十歸劑而四歸量也

通三錢三分三
重三錢七分四重

下瘀血湯

治臍下毒痛或經水不利者

大黃二兩 桃仁二十個 蟬蟲二十枚

右三味末之煉蜜和為四丸以酒一升
煎一丸取八合

土瓜根散

治小腹拘急及經水有變者

芍藥 桂枝 蘿蔔 土瓜根 各三分

右四味杵為散酒服方寸匕

薏苡附子散

治身體疼痛惡寒或浮腫者

薏苡仁十五兩 大附子十枚

右二味杵為散服方寸匕

薏苡附子敗醬散

治身甲錯腹皮急按之濡如腫狀者
薏苡仁十分附子二分敗醬五分

若三味杵為散取方寸匕以水二升煎
減半頓服

烏頭湯

治骨節疼痛不可屈伸若腹絞痛自汗

盜汗者

麻黃三兩

五分一重

芍藥三兩

同

黃耆三兩

同

甘草三兩

同

川烏頭五枚

一錢三分七重

以蜜二

升

四升

煎取一升

二升錢

即出烏頭

右四味以水三升

一合

煮取一升

去滓

內蜜煎中更煎之

是則十歸劑而二歸量也

通三錢分一重

赤丸

治慄而嘔身疼痛惡寒或有痰飲者
茯苓四兩半夏四兩烏頭二兩細辛一
右四味末之內真朱為色煉蜜丸如麻
子大先食酒飲服三丸

天雄散

治小便不利身疼痛惡寒上衝臍下有

動者

天雄三枚术八兩桂枝六兩龍骨三兩

右四味杵為散酒服半錢匕

括囊薤白白酒湯

治胸背痛或喘息咳嗽者

括囊實一枚七分薤白半升
二錢四量白酒七升

一合四兩右三味同煮取二升四量

是則五歸劑而五歸量也通三錢七分四厘

括蔞薤白半夏湯

治括蔞薤白白酒湯證而嘔者

括蔞實一枚七分薤白三兩二錢半夏半升

同 白酒一斗二合

右四味同煮取四升八分

是則五歸劑而五歸量也通四錢七分八厘

文蛤散

治渴者

文蛤 五兩

右一味為散以沸湯和一錢匕服

半夏苦酒湯

治咽中生瘡音啞者

半夏洗破如枣核

十四枚

雞子一枚去黃存白
內苦酒於其上

右二味內半夏著苦酒中以雞子殼置
刀環中安火上令三沸去滓少少嚥之

半夏乾薑散

治乾嘔吐逆涎沫者

半夏 乾薑各等分

右二味杵為散取方寸匕漿水一升半
煎取七合

乾薑人蔘半夏丸

治嘔吐不止心下痞鞕者

乾薑一兩人蔘一兩半夏二兩

右三味末之以生薑汁糊為丸

三物黃芩湯

治心胸苦煩者

黃芩一兩四分二厘五毛苦參二兩八分五厘乾地黃四

兩一錢
七分

右三味以水六升一合五勺煮取二升五勺
是則四歸劑而四歸量也通三錢九分七厘五毫

枳實芍藥散

治心下結實而拘攣者

枳實 芍藥各等分

右二味杵為散服方寸匕

排膿散

治心下結實及拘攣若吐粘痰者

枳實十六芍藥六桔梗二分

右三味杵為散取雞子黃一枚以藥散
與雞黃相等揉和令相得飲和服之

橘皮湯

治嘔逆而嘔者

橘皮四兩

一錢一分
三分量

生薑半斤

二錢
三分量

右二味以水七升

一合
四分量

煮取三升

六分量

是則六歸劑而五歸量也

重三錢三分量

旋覆花代赭石湯

治心下痞鞶噯氣不除而嘔吐者

旋覆花

三兩

人蔘三兩

生薑五兩

半夏

半升大棗

十枚

甘草三兩

代赭石一兩

右七味以水一斗煮取六升去滓再煎
取三升

赤石脂禹餘糧湯

治毒在臍下而利者

赤石脂一斤禹餘糧一斤

右二味以水六升煮取二升

桃花湯

治下利便膿血者

赤石脂一斤乾薑一兩粳米一升

右三味以水七升煮米令熟去滓溫七合內赤石脂末方寸匕

蜜煎導

治肛中乾燥不大便者

蜜七合

右一味內銅器中微火煎之稍凝似餡
狀擾之勿令焦著欲可丸併手捻作挺
令頭銳大如指長二寸許當熟時急作
冷則硬以內穀道中以手急抱欲大便
時乃去之

酸棗仁湯

治煩不得眠者

酸棗仁二升二錢甘草一兩一分知母二兩

三分三童子丸同茯苓二兩同芎芻二兩同

右五味以水八升一合三勺煮酸棗仁得六升一合內諸藥煮取三升五勺

是則十五歸劑而六歸量也通三錢四分八厘八毛

葶藶大棗湯

治浮腫喘鳴強急者

葶藶搗丸如彈丸大大棗十二枚

右二味先以水三升煮大棗取二升內

葶藶煮取一升

巴椒葶藶黃丸

治浮腫喘鳴腹滿或口舌乾燥者

防已

椒目

葶藶

大黃各一兩

右四味末之蜜丸如梧子大飲服一丸

蜀漆散

治臍下有動寒熱有時者

蜀漆

雲母

龍骨各等分

右三味為散未發前以漿水服半錢也

麻子仁丸

治大便難喘而胸腹滿者

大黃一斤

枳實一斤

厚朴一尺

芍藥半斤

杏仁一升 麻子仁二升

右六味末之煉蜜和丸梧子大

礬石湯

治腳痿弱不仁者

礬石二兩

右一味以漿水一斗五升煎三五沸浸

腳

消礬散

治一身黃腫或大便黑時溏者

消石 磬石 各等分

右二味為末以大麥粥汁和服方寸匕

礬石丸

治經水不利下白物者

礬石 三分 杏仁 一分

右二味末之煉蜜和丸棗核大內藏中

蛇牀子散

治下白物陰中痒或有小瘡者

蛇牀子仁

右一味末之以白粉少許和令相得如

棗大綿裹內之

長生翁曰右諺撰余書試之于手徵

之於術之意而以為躬自不可欺之
監戒已不敢希于公

定正方極卷之下 終

寛政乙卯季夏望日

大岳晃敬改書於南澣綠竹園

天保二年歲在辛卯暮春日刻於家塾

門人 小島明謹寫

題定正方極後

疾醫之道不傳于世也舊矣當東漢之時長沙氏之書獨載其方法矣自是而世之言醫者皆祖述其書焉然而歷世相傳之久簡編散軼是以晉王叔和集而撰次之加以私說然後王后混淆薰蕕同器疾醫之道亦幾熄矣後雖多註家皆修其腐論

獨哉 東洞翁生千載之下始淘汰其沙礫特見其真然後類聚長沙諸方爲方極一卷然唯舉各方之證以建其極若夫劑量水率稱 本朝衡量者未見其書或謂別著方選藏于家塾又於坊間見其分量考者數本然皆其門人諸子之所述疏略甚多矣曩 長圭翁親受其教傳其術而

於方極加分量考且分為三卷上則載其
方正而有腹狀者中則列非日用方或奇
而無腹狀者下則錄其方不正而有疑者
使倉卒之際便於檢用也 東洞翁之教
於是乎明矣長沙氏之道於是乎顯矣嗚
呼偉矣哉 長圭翁之精於此道於今三
代之遺方其劑量可觀其事實可行者獨

曰斯書之成矣乃勒傳之於門徒蓋升堂
入室者才數人耳貫首弟子 桐谷翁復
監定之以傳之於我 大岳先生於是乎
先生再考訂之仍以其所聞與其所發明
書於各篇之中又採東洞家塾方正而
不可闕者附之以廣其傳實精撰而無餘
蘊者矣予嘗游事 先生讀之久矣久而

施之疾病疾病得始有瘳矣何則其有物
與則合也詩曰天生烝民有物有則民之
秉彝好是懿德大哉長沙氏之德傳其聖

方遂及我 東方恭惟

神祖仁賢鎮撫四海愛養黎庶承平二百
餘年是以大化滂流文教日闡俊傑之士
繼踵而出百廢俱興我醫方之復于古亦

唯明垂之餘澤矣哉

文政十二年己丑仲春日

館林後學 小島明有卿父謹撰





